

# 樂得美乳膏5% Aldara®

Imiquimod Cream 5% w/w

Patient Information Leaflet

衛署藥輸字第023790號  
藥物資料說明，供使用者參考

## 「樂得美®」乳膏5% Aldara® Cream 5%

說明書內容  
本說明書的目的是回答一些關於「樂得美」（Aldara®）常見的問題，因此並不包括一切有關的資料，亦不可取代醫生或藥師的指示。如需獲得「樂得美」的進一步資料，請向醫生或藥師查詢。

所有藥物均具效益，但同時亦帶風險。醫生在為您處方「樂得美」的時候，已權衡兩者的好壞。如對使用「樂得美」有任何疑慮，請向醫生或藥師查詢。

請務必認清書與「樂得美」乳膏一併存放，以便隨時查閱。

**產品說明**  
「樂得美」乳膏是一種呈白色至淡紫色的膏狀物體，每盒乳膏內分12小包，以獨立紙狀包裝，每包可用一次，內含250毫克乳膏，足夠塗抹面積達20平方厘米的疣患。

**成份**  
每公克的5%乳膏含有50毫克Imiquimod，均勻分佈於異硬脂酸、硬脂醇、硬脂醇醇、白凡士林、多山梨醇(4)、單硬脂酸三乙醇胺、甘油、椰油、硬脂、聚氧喹醇、地水、羧甲醇、對羧苯甲酸甲酯和羧苯甲酸三乙醇胺所組成或白色，油溶水，有光澤的乳膏基劑中。

**「樂得美」是甚麼？**  
「樂得美」乳膏含有一種療效的成份，稱為imiquimod，可改進人體免疫的反應，使人體製造更多干擾素（interferon）。干擾素是人體內自然產生的抗病毒物質。雖然目前仍未確定「樂得美」是透過何種方式消除性病疣，但一般相信是基於它對免疫系統所產生的影響。

**「樂得美」的適應症**  
「樂得美」Aldara®乳膏5%指定用來治療成人生殖器外部的疣和肛門周圍的疣和濕性疣瘻（condyloma acuminata）。

由於目前並無就「樂得美」對十八歲以下病人的療效進行研究，故不建議使用「樂得美」於該年齡以下的人士。

**使用前如有下列情況，請勿使用「樂得美」：**  
•如對imiquimod或產品說明所列的任何成份敏感；  
•出現於陰道、肛門或尿道內的疣患，因為目前並無就「樂得美」對這些人體部位的效用與安全性進行研究；  
•包裝損毀、有曾被使用的痕跡或過期（有效日期列於紙盒或包裝袋上）；  
•皮膚有潰瘍或未癒合之瘡患

如出現下列情況，請在使用「樂得美」前告知醫生：  
•懷孕或正計劃懷孕；  
•正在對以母乳哺育嬰兒；  
•已經成為或認為自己是愛滋病帶菌者；及  
•正以其他藥物治疣患，或以前曾使用「樂得美」治療疣患。

**使用說明及建議用量**  
•一般的使用次數為每週三次，每天在睡前前使用一次，每逢星期一、三、五或二、四、六或遵照醫生的指示使用。  
•應持續使用乳膏，直至疣患完全消失為止，但不應連續使用超過十六週。  
•疣患一般在用後八至十星期消失，也可早至四星期便痊癒。  
•如疣患復發，請告知醫生。

**使用方法**  
1. 睡前前，請將雙手洗淨，然後將每個包裝袋，將「樂得美」乳膏擠於手指頭上。

2. 將乳膏薄塗於潔淨而乾爽的疣患表面，輕輕按摩，直至乳膏完全滲透。

3. 完成後，請把剩餘的乳膏連包裝袋一併丟棄，勿讓兒童接觸。讓以性質溫和的肥皂和水清洗雙手。

4. 在塗抹乳膏後六至十小時內，請用性質溫和的肥皂和清水清洗患處。

5. 六至十小時後，應以性質溫和的肥皂和水清洗雙手。

6. 完成後，請把剩餘的乳膏連包裝袋一併丟棄，勿讓兒童接觸。讓以性質溫和的肥皂和水清洗雙手。

7. 因為Aldara®並不假根治疣患，病人應注意，在Aldara®治療當中仍可能會長出新的疣。

8. 疣患在塗抹區域或其周圍，有下列皮膚反應，如紅腫、癢癢、剝皮/薄片剝落，及潰瘍，反應大於預期程度中度的，請立即停止治療，請速告知醫生。

9. 常塗上藥後，應避免與性接觸（性交、肛交、口交）。

10. 塗藥後6-10小時後用中性皂和清水洗淨。

11. 通常在塗抹區域或其周圍，有下列皮膚反應，如紅腫、癢癢、剝皮/薄片剝落，及潰瘍，反應大於預期程度中度的，請立即停止治療，請速告知醫生。

12. 未割包皮之男性使用Aldara®乳膏治療包皮下之疣時，應每天割回包皮，清洗患部。

13. 因為Aldara®並不假根治疣患，病人應注意，在Aldara®治療當中仍可能會長出新的疣。

14. 常塗上藥後，應避免與性接觸（性交、肛交、口交）。

15. 塗藥後6-10小時後用中性皂和清水洗淨。

16. 通常在塗抹區域或其周圍，有下列皮膚反應，如紅腫、癢癢、剝皮/薄片剝落，及潰瘍，反應大於預期程度中度的，請立即停止治療，請速告知醫生。

17. 未割包皮之男性使用Aldara®乳膏治療包皮下之疣時，應每天割回包皮，清洗患部。

18. 因為Aldara®並不假根治疣患，病人應注意，在Aldara®治療當中仍可能會長出新的疣。

19. 常塗上藥後，應避免與性接觸（性交、肛交、口交）。

20. 塗藥後6-10小時後用中性皂和清水洗淨。

21. 通常在塗抹區域或其周圍，有下列皮膚反應，如紅腫、癢癢、剝皮/薄片剝落，及潰瘍，反應大於預期程度中度的，請立即停止治療，請速告知醫生。

22. 未割包皮之男性使用Aldara®乳膏治療包皮下之疣時，應每天割回包皮，清洗患部。

23. 因為Aldara®並不假根治疣患，病人應注意，在Aldara®治療當中仍可能會長出新的疣。

24. 常塗上藥後，應避免與性接觸（性交、肛交、口交）。

25. 塗藥後6-10小時後用中性皂和清水洗淨。

26. 通常在塗抹區域或其周圍，有下列皮膚反應，如紅腫、癢癢、剝皮/薄片剝落，及潰瘍，反應大於預期程度中度的，請立即停止使用「樂得美」，並通知醫生。

27. 請依照建議份量將乳膏塗於疣患表面，切勿過量使用。

•懷孕或以母乳哺育嬰兒期間，應停止使用「樂得美」。

•醫生或藥師考慮您的個人情況而處方藥膏，即使您認為自己的情況與他人相若，亦不應將乳膏轉贈他人。

忘記使用「樂得美」

若忘記塗抹乳膏，應在發現後立即塗適量的乳膏塗於患處，並繼續原定之療程。

在任何情況下，切勿因忘記用藥而將份量加倍。

副作用  
即使在正常情況下使用「樂得美」乳膏，亦可能出现副作用，如在使用後以致任何不適，應立即通知你的醫生或藥師。許多副作用源自於皮膚之局部反應，常見的副作用包括紅腫、皮膚癢、皮膚與周圍腫脹、皮下組織硬化、細小瘡患、治療時患處結痂、皮下出現小氣泡等。有時局部使用後會有發癢、灼熱與疼痛的感覺，大部份的皮膚反應均屬溫和至中至，在停藥而後即可恢復正常。

這些副作用亦可能與乳膏發揮作用時聯系，若皮膚反應過於嚴重或感到極為不適，應以溫水和肥皂清洗患處皮膚，並與醫生或藥師聯絡。

若你皮膚不適之反應，不在以上所述之範圍內，也請諮詢你的醫生或藥師。

**用藥過量**  
使用過多「樂得美」乳膏，會引致皮膚出現嚴重的反應。因此，應以性質溫和的肥皂和清水洗去多餘的乳膏。皮膚反應問題一般解決，使患處腫脹。

誤吞乳膏會引致噁心、嘔吐頭痛、肌肉疼痛和發熱。若誤吞乳膏，請立即就近的急診室求醫或通知醫生。

**儲存方法**  
應把「樂得美」乳膏存放在陰涼而乾爽的地方，溫度保持在25°C以下，但切勿冷凍。請小心存放「樂得美」，勿讓兒童拿取。

「樂得美」於海大特製製造。

本說明書於2020年4月擬稿。

**包裝：**  
「樂得美®」乳膏5% Aldara® (imiquimod) Cream 5% 每小包是單次使用包裝，內裝250mg乳膏，每盒12小包以下。

• 應存放在不超過25°C的地方，並不可冷凍。

**製造廠**  
Ensign Laboratories Pty Ltd  
490-500 Wellington Road  
Mulgrave VIC 3170 Australia

**藥商**  
裕利股份有限公司  
台北北崙山區南京東路四段126號10樓，10樓之1-3

**警告**  
Aldara®乳膏並不能應用來治療陰道的、陰道內部的、子宮頸的、直腸的、或肛門內的人類乳頭狀病毒感染。

**注意事項**  
• 通常局部皮膚反應如紅腫、癢癢、剝皮/薄片剝落，及潰瘍。

• 若是發生嚴重上述反應，應用中性肥皂和水清洗藥品。

• 當上述反應情況消滅後可以重新使用Aldara®乳膏。

• 目前尚無在其他皮膚治療生殖器疣後，緊接著使用Aldara®乳膏的臨床經驗，因此你應先向使用藥物品說明書了解生殖器疣預防問題。

• 傷口未癒合之前，並不推薦使用Aldara®乳膏。Aldara®有可能加重原有的皮膚發炎。

**病人使用須知**  
病人在使用Aldara®乳膏5%前必須接受下列資訊和指示。  
Aldara®乳膏5%是否會降低生殖器/肛門周圍疣的傳染，目前仍未知。  
Aldara®乳膏5%可能減低消除疣和預防復發的功能，因此不推薦一起使用。

1. 本藥為外用藥須由醫生處方使用，藥品不得碰觸眼睛。

2. 治療的患部不能用膠帶包裹，或覆蓋紗布。

3. 常塗上藥後，應避免與性接觸（性交、肛交、口交）。

4. 塗藥後6-10小時後用中性皂和清水洗淨。

5. 通常在塗抹區域或其周圍，有下列皮膚反應，如紅腫、癢癢、剝皮/薄片剝落，及潰瘍，反應大於預期程度中度的，請立即停止治療，請速告知醫生。

6. 未割包皮之男性使用Aldara®乳膏治療包皮下之疣時，應每天割回包皮，清洗患部。

7. 因為Aldara®並不假根治疣患，病人應注意，在Aldara®治療當中仍可能會長出新的疣。

8. 常塗上藥後，應避免與性接觸（性交、肛交、口交）。

9. 塗藥後6-10小時後用中性皂和清水洗淨。

10. 通常在塗抹區域或其周圍，有下列皮膚反應，如紅腫、癢癢、剝皮/薄片剝落，及潰瘍，反應大於預期程度中度的，請立即停止治療，請速告知醫生。

11. 未割包皮之男性使用Aldara®乳膏治療包皮下之疣時，應每天割回包皮，清洗患部。

12. 因為Aldara®並不假根治疣患，病人應注意，在Aldara®治療當中仍可能會長出新的疣。

13. 常塗上藥後，應避免與性接觸（性交、肛交、口交）。

14. 塗藥後6-10小時後用中性皂和清水洗淨。

15. 通常在塗抹區域或其周圍，有下列皮膚反應，如紅腫、癢癢、剝皮/薄片剝落，及潰瘍，反應大於預期程度中度的，請立即停止使用「樂得美」，並通知醫生。

16. 請依照建議份量將乳膏塗於疣患表面，切勿過量使用。

**臨床研究**

一個以209位年齡18歲以上，患有生殖器/肛門周圍疣但健康狀況良好之病人為對象的雙盲安慰劑對照臨床試驗，給予病人Aldara®乳膏5%或只有賦形劑軟膏，每週塗抹一次，最多治療16週。疣的基面面積單位數是69mm<sup>2</sup>（範圍從8.915525mm<sup>2</sup>），參與此臨床試驗病人，如下表所示：

每週塗抹三次之疣患部反應分析		初度中度		嚴重	
	女性	男性	女性	男性	
	賦形劑 (Imiquimod)	5% 賦形劑 (Imiquimod)	賦形劑 (Imiquimod)	5% 賦形劑 (Imiquimod)	賦形劑 (Imiquimod)
病人數	114	99	158	157	114
完成16週治療但未痊癒者	61%	21%	54%	22%	4%
癢癢	30%	8%	29%	6%	1%
刺痛/薄片剝落	18%	8%	25%	8%	0%
浮腫	17%	5%	12%	1%	0%
硬化的	5%	2%	7%	2%	0%
潰瘍	5%	1%	4%	1%	3%
結痂	4%	0%	13%	3%	0%
長水泡	3%	0%	2%	0%	0%

每週三次Imiquimod 5% 乳膏的男女病人中也有患部外的皮膚反應，最常見的患部外皮膚反應報告，在女性：紅斑、潰瘍2%、及浮腫1%；在男性者：癢癢2%、紅斑、浮腫、硬化、剝皮/薄片剝落各有1%。

副作用事件中經判斷認為可能與Aldara®有關的報告，但超過5%者，如下表所示。其中亦包括傷口刺痛、類似感冒症狀和肌肉痛等症狀。

每週塗抹三次			
	5% Imiquimod	賦形劑	5% Imiquimod
病人數	117人	103人	156人
副作用反應			
頭痛	32%	20%	22%
發燒	26%	12%	9%
傷口刺痛	8%	2%	1%
類似感冒	3%	0%	0%
肌肉疼痛	11%	3%	2%
全身性反應			
頭痛	4%	3%	5%
類似感冒症狀	3%	2%	1%
肌肉痛	1%	0%	1%

\*事件發生與Aldara®不一定有關

副作用中認定或許或可能與Aldara®有關，且超過1%的報告者包括：塗抹部位疼痛；在患部反應（灼熱感、皮膚癢感、刺痛、癢、痛、紅腫、癢感、傷口疼痛、刺痛與癢痛）；患部外反應（流血、灼熱感、癢、痛、癢痛、癢痛）；全身性反應：疲累、發燒、類似感冒症狀；中樞與周邊神經系統障礙；頭痛；胃腸系統障礙；如腹瀉；以及肌肉骨格系統障礙；肌肉痛。

**過量**  
人類使用Aldara®乳膏5%，因局部皮膚吸收之量甚低，不會導致過量。在用乳膏皮膚所做的動物試驗，皮膚使用Imiquimod之致死劑量1600mg/2以上，持續的塗抹過量的Aldara®乳膏5%，會引起嚴重的高部皮膚反應。在多次口服200mg以上劑Imiquimod劑量後，最常見的嚴重副作用是引起低血壓，唯在口服後數小時後，即可解除。

**劑量與使用方法**  
Aldara®乳膏5%每週塗抹三次，每次在睡前才塗在患部，6-10小時之後（即第二天早晨），用中性皂和水清洗，每週三次，可在一週一、三、五、或週二、四、六的順序塗用。使用Aldara®治療，需持續到生殖器/肛門周圍疣完全消除，或最多用16週。

在治療時常有患部皮膚反應（紅腫），假若患部非常不舒服或發生嚴重的皮膚反應時，可以停用幾天，待皮膚反應減輕後，可再塗抹。在處理這些皮膚反應時，可使用非類固醇性的藥物，如鈣鈣鈉或含薄荷膏內膏。醫生應亦教導病人正確的塗藥方法與劑量，以得到最佳的治療效果。塗藥前後應洗手。

Aldara®乳膏5%是單次使用量包裝，內含量可足夠塗20cm<sup>2</sup>，要避免使用過量，病人要被教導塗在外部生殖器/肛門周圍疣上，薄薄一層塗在患部，抹一抹，直到看不見藥膏為止，不可緊密蓋患部。

**包裝：**  
Aldara® (Imiquimod) 乳膏5% 每小包是單次使用包裝，內裝250mg乳膏，每盒12小包以下。

貯存溫度不可超過25°C，亦不可冷凍。

**製造廠：**  
Ensign Laboratories Pty Ltd  
490-500 Wellington Road  
Mulgrave VIC 3170 Australia

**藥商：**  
裕利股份有限公司

台北北崙山區南京東路四段126號10樓，10樓之1-3

**警告**  
Aldara®乳膏並不能應用來治療陰道的、陰道內部的、子宮頸的、直腸的、或肛門內的人類乳頭狀病毒感。

**注意事項**  
• 通常局部皮膚反應如紅腫、癢癢、剝皮/薄片剝落，及潰瘍。

• 若是發生嚴重上述反應，應用中性肥皂和水清洗藥品。

• 當上述反應情況消滅後可以重新使用Aldara®乳膏。

• 目前尚無在其他皮膚治療生殖器疣後，緊接著使用Aldara®乳膏的臨床經驗，因此你應先向使用藥物品說明書了解生殖器疣預防問題。

• 傷口未癒合之前，並不推薦使用Aldara®乳膏。Aldara®有可能加重原有的皮膚發炎。

**病人使用須知**  
病人在使用Aldara®乳膏5%前必須接受下列資訊和指示。  
Aldara®乳膏5%是否會降低生殖器/肛門周圍疣的傳染，目前仍未知。  
Aldara®乳膏5%可能減低消除疣和預防復發的功能，因此不推薦一起使用。

1. 本藥為外用藥須由醫生處方使用，藥品不得碰觸眼睛。

2. 治療的患部不能用膠帶包裹，或覆蓋紗布。

3. 常塗上藥後，應避免與性接觸（性交、肛交、口交）。

4. 塗藥後6-10小時後用中性皂和清水洗淨。

5. 通常在塗抹區域或其周圍，有下列皮膚反應，如紅腫、癢癢、剝皮/薄片剝落，及潰瘍，反應大於預期程度中度的，請立即停止治療，請速告知醫生。

6. 未割包皮之男性使用Aldara®乳膏治療包皮下之疣時，應每天割回包皮，清洗患部。

7. 因為Aldara®並不假根治疣患，病人應注意，在Aldara®治療當中仍可能會長出新的疣。

8. 常塗上藥後，應避免與性接觸（性交、肛交、口交）。

9. 塗藥後6-10小時後用中性皂和清水洗淨。

10. 通常在塗抹區域或其周圍，有下列皮膚反應，如紅腫、癢癢、剝皮/薄片剝落，及潰瘍，反應大於預期程度中度的，請立即停止治療，請速告知醫生。

11. 未割包皮之男性使用Aldara®乳膏治療包皮下之疣時，應每天割回包皮，清洗患部。

12. 因為Aldara®並不假根治疣患，病人應注意，在Aldara®治療當中仍可能會長出新的疣。

13. 常塗上藥後，應避免與性接觸（性交、肛交、口交）。

14. 塗藥後6-10小時後用中性皂和清水洗淨。

15. 通常在塗抹區域或其周圍，有下列皮膚反應，如紅腫、癢癢、剝皮/薄片剝落，及潰瘍，反應大於預期程度中度的，請立即停止使用「樂得美」，並通知醫生。

16. 請依照建議份量將乳膏塗於疣患表面，切勿過量使用。

17. 應立即停止使用「樂得美」，並通知醫生。

18. 應立即停止使用「樂得美」，並通知醫生。

19. 應立即停止使用「樂得美」，並通知醫生。

20. 應立即停止使用「樂得美」，並通知醫生。

21. 應立即停止使用「樂得美」，並通知醫生。

22. 應立即停止使用「樂得美」，並通知醫生。

23. 應立即停止使用「樂得美」，並通知醫生。

24. 應立即停止使用「樂得美」，並通知醫生。

25. 應立即停止使用「樂得美」，並通知醫生。

反應。在每週塗抹三次，其反應強度通常呈輕微到中度的，但也有嚴重反應的報告，每天塗抹每週塗抹三次的副作用反應較多，較強，在每週塗抹三次的臨床試驗中，有1.2% (4/327) 患者，因患部和周邊皮膚反應而中斷使用。

臨床試驗患部皮膚反應的發生率和嚴重程度如下表：

每週塗抹三次之疣患部反應分析		初度中度		嚴重	
	女性	男性	女性	男性	
	賦形劑 (Imiquimod)	5% 賦形劑 (Imiquimod)	賦形劑 (Imiquimod)	5% 賦形劑 (Imiquimod)	賦形劑 (Imiquimod)
病人數	114	99	158	157	114
完成16週治療但未痊癒者	61%	21%	54%	22%	4%
癢癢	30%	8%	29%	6%	1%
刺痛/薄片剝落	18%	8%	25%	8%	0%
浮腫	17%	5%	12%	1%	0%
硬化的	5%	2%	7%	2%	0%
潰瘍	5%	1%	4%	1%	3%
結痂	4%	0%	13%	3%	0%
長水泡	3%	0%	2%	0%	0%

每週三次Imiquimod 5% 乳膏的男女病人中也有患部外的皮膚反應，最常見的患部外皮膚反應報告，在女性：紅斑、潰瘍2%、及浮腫1%；在男性者：癢癢2%、紅斑、浮腫、硬化、剝皮/薄片剝落各有1%。

副作用事件中經判斷認為可能與Aldara®有關的報告，但超過5%者，如下表所示。其中亦包括傷口刺痛、類似感冒症狀和肌肉痛等症狀。

每週塗抹三次			
	5% Imiquimod	賦形劑	5% Imiquimod
病人數	117人	103人	156人
副作用反應			
頭痛	32%	20%	22%
發燒	26%	12%	9%
傷口刺痛	8%	2%	1%
類似感冒	3%	0%	0%
肌肉疼痛	11%	3%	2%
全身性反應			
頭痛	4%	3%	5%
類似感冒症狀	3%	2%	1%
肌肉痛	1%	0%	1%