



永康敏[®]膜衣錠10毫克

Alltec F.C. Tablets 10 mg

成分：每膜衣錠含：

Cetirizine dihydrochloride10 mg

賦型劑：Lactose、Starch、Avicel、Aerosil、P.V.P.K-30、Polysorbate 20、Magnesium Stearate、Primojel、Sepifilm、P.E.G.6000

特性：

本品是具有選擇性的H₁-receptor拮抗劑，無明顯的Anti-cholinergic及Anti-Serotonin作用；在有效劑量下，主成分Cetirizine 不會通過腦血管障壁，對中樞神經產生作用，因此不會產生鎮靜、嗜眠以及行為異常現象。本品是一種有效的、安全的過敏疾患治療劑。

藥理作用：

1. 迅速抑制外生性組織胺。
2. 抑制內生性組織胺的釋出（如：48/80之組織胺）。
3. 抑制由VIP (Vasoactive Intestinal Polypeptide) 和 Substance P所引起的過敏反應。
4. 抑制皮膚過敏反應初期組織胺介質的作用。
5. 明顯抑制發炎性細胞（例如：eosinophils）的移動，因而降低皮膚過敏反應晚期的介質釋放。
6. 顯著降低氣喘患者的支氣管對組織胺的過度反應。
7. 降低由特殊過敏原引起的過敏反應。這些抗過敏反應，未伴隨任何中樞反應發生，可經由心智測驗或EEG定量得到證明。

藥物動力學：

口服Cetirizine後，1小時內可達到（血中最高濃度）；其體內半衰期，在成人約為10小時，6~12歲小孩約為6小時；成人與小孩的腎排泄總量（Cumulative urinary excretion），約為投予劑量的三分之二。通常孩童的血漿清除率要比成人為高。Cetirizine的血漿濃度與投藥量呈線性關係。Cetirizine與血漿蛋白有很高的結合率。

適應症：

季節性鼻炎、結膜炎、過敏性鼻炎、蕁麻疹、過敏性搔癢等過敏現象。

用法用量：

本藥須由醫師處方使用。

成人及6歲以上兒童適用。大部份患者，均以一錠10mg為初始劑量，空腹服用較佳，餐中併服亦可，一般於晚餐時，以少量液體服用一錠；亦可順應個人方便而調節服用時間。

對副作用敏感的患者改為早晚各服5mg（即半錠）。

禁忌症：對本品中任何成份或hydroxyzine有過敏反應者。

副作用：

一般而言，永康敏膜衣錠的副作用是輕微的，對Cetirizine的過敏性徵狀極少；因而導致停止服用的機率更低。由客觀的精神運動性(psychomotor)的試驗結果，Cetirizine的鎮靜作用發生率與安慰劑相同。最常見的副作用為疲倦、想睡、口乾。依據實驗結果，想睡之發生率與治療劑量是相關的；安慰劑之發生率為6%、劑量5mg之發生率為11%、劑量10mg之發生率為14%。

注意事項：

1 雖然在治療劑量下，Cetirizine 不會加重酒精（血中濃度0.8g/L）的作用，但最好避免同時並用。

2 孕婦及授乳婦：

動物實驗尚無致畸胎之報告，但懷孕（尤其是前3個月）及哺乳的婦女最好避免服用。

3 藥物交互作用：

至今尚未有藥物交互作用方面的報告，但若同時服用鎮靜劑者，請謹慎使用。

4 駕駛或操作機械：

實驗證明，正常人投予20~25mg/天的劑量，不會影響警覺及反應時間，但從事駕駛及機械操作者，應小心使用，並儘量避免不要操作。

5 過量：

一次服用50mg以上，會有安眠症狀發生，無特殊解毒劑，因此，如有此現象發生，應儘快以灌腸法及一般急救法處理。

貯存方法：請存放在室溫15~25°C乾燥處。

包裝：2~1000'S 鋁箔盒裝、塑膠罐裝。

瑞士藥廠股份有限公司

SWISS PHARMACEUTICAL CO., LTD.

新市廠：台南市新市區中山路182號