



施美®

百潔碘軟膏

傷口消毒

C.B.® Biodyne Ointment (Povidone Iodine)

有效成分及含量: 每公克含有

有效成分	含量
Povidone Iodine	100mg
(相當於有效碘)	10mg)

其他成分(賦形劑): PEG 4000, PEG 300

用途(適應症):

緊急處理擦傷、切傷、刺傷、抓傷等導致皮外之傷口及傷口周圍的消毒、殺菌來防止傷口的感染。

使用上注意事項:

- 一、有下列情形者,請勿使用:
曾因本藥成分引起過敏。
- 二、有下列情形者,請洽醫師診治:
(一)3歲以下。
(二)有深部皮膚組織感染或大面積傷口、動物咬傷、嚴重燒燙傷。
- 三、有下列情形者,使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生:
兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- 四、其他使用上注意事項
(一)為防止兒童誤食請妥善保管。
(二)避免陽光直射。
(三)勿超過建議使用量或使用次數。
(四)使用部位或其周圍髒污時,請洗乾淨後再用藥。
(五)使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
(六)本藥限於外用不得內服,亦不得施於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)、濕疹、潰爛、龜裂或嚴重外傷之患部。
(七)請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛,請立刻以水或溫水沖洗,並立即前往眼科就醫。
(八)本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。
(九)使用後請保持塗抹部位透氣,勿密封,以免增加副作用。
(十)有全身性吸收之可能,因此反覆使用新生兒可能出現甲狀腺功能低下,孕婦及其胎兒及哺乳婦有造成甲狀腺腫及甲狀腺功能低下。

(十一)會使皮膚或衣物染色。

用法用量:

一日數次	塗抹於患部,或以紗布、脫脂棉等沾取塗抹
------	---------------------

警語:

- 一、使用本藥後,若有發生以下症狀時,請立即停止使用,並接受醫師診治:
(一)若有上述外之其他不適情況產生。
(二)使用7天後,自覺狀況沒有改善或更惡化。
(三)使用後出現尋麻疹、浮腫、胸悶等症狀,及臉色蒼白、手腳冰冷、冒冷汗、呼吸困難等現象。

包裝: 1,000公克以下鋁軟管、塑膠瓶裝。

儲存條件: 於室溫(30°C以下)處保存,並置於孩童無法觸及之處。

製造廠



中國化學製藥股份有限公司

CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

新豐工廠: 新竹縣新豐鄉坑子口182-1號@

http://www.ccpq.com.tw

總公司: 台北市中正區襄陽路23號 TEL: (02)23124200

總經銷



中化裕民健康事業股份有限公司

Chung-hwa Yuming Healthcare Co., Ltd.

總公司: 台北市中正區襄陽路23號8樓

