

“台裕” 倍達邁松 注射液 (貝他每松)

Betamethasone Injection “Tai Yu”

【成分】

Each ml contains:

Betamethasone sodium phosphate..... 5.3mg
(equivalent to Betamethasone 4mg)

【作用】

1. 內科及小兒科：
膠原病副腎皮質機能不全症、支氣管炎、藥物過敏症、枯草熱、
甲狀腺中毒、重症急性肝炎、局部性回腸炎、潰瘍形大腸炎、
急性白血症、骨髓性白血症、腦脊髓炎、顏面神經麻痺、結核
性胸膜炎、特發性低血糖症。
2. 外科：
副腎全摘除、副腎腫瘍摘除、組織移植時外科之重症感染症。
3. 眼科：
眼瞼結膜疾患、交感性眼炎、視束炎。
4. 皮膚科：
蕁疹、中毒疹、紫斑病、妊娠性疱疹、火傷、紅皮症、增殖性
天疱疹、紅斑症、結節性痒疹、圓形脫毛症、角化症。

【適應症】

膠原病、腎炎性症候群、過敏性皮膚疾患、重症感染症。

【用法用量】

1. 靜脈及肌肉注射，每次 4~12mg，每日 1~2 次。
2. 點滴靜脈注射，一日 1~2 次，1 次 4~20mg，以生理食鹽水或
稀葡萄糖液稀釋注射之。
3. 關節腔內注射 0.4~4mg 為度，但以關節之大小度量之。
4. 脊髓腔內及胸腔內注射，每週 1~3 次，每次 1~4mg，視症狀
酌量使用之。
5. 本藥限由醫師使用。

【注意事項】

1. 急慢性感染症，使用時請同時併用適當的化學療法劑或抗生素
藥品以治療感染疾病。
2. 對消化管障礙如：胃腸潰瘍患者務請特別注意。
3. 因主要副作用為引起浮腫、血壓上升，尤以腎臟疾患及高血壓
患者應注意。
4. 糖尿病患者使用時，請注意增加 Insulin 之用量。
5. 對於有精神病因素者多加注意。
6. 服用本劑期間請充分補充蛋白質。
7. 妊婦及授乳婦之投藥應特別慎重或禁止使用。
8. 曾有文獻報導於硬脊膜外注射(epidural administration)給
予皮質類固醇後發生罕見但嚴重的神經系統不良反應，包
括視力喪失、中風、癱瘓、死亡等，多數個案發生於懸浮
或緩釋劑型之皮質類固醇類注射劑成分藥品。
9. 本產品含有防腐劑成分，不應以椎管內(intracanal)或硬脊
膜外(epidural)注射給藥。

【賦形劑】

Sodium Bisulfite、Citric Acid、Nicotinamide、Benzyl Alcohol
Sodium Citrate Hydrate、Sodium Hydroxide、Edetate Disodium
Sodium Hydrosulfite、Water for Injection.

【貯藏方法】

25°C以下避光貯存。

【包裝】

1 毫升玻璃安瓿裝，100 支以下盒裝。

台裕化學製藥廠股份有限公司



TAI YU CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.
新竹縣竹東鎮員山路 11 巷 13 弄 1 號

TEL : (03)5826655 FAX : (03)5822389