



## 痛獲平<sup>®</sup> 錠 5 毫克

### Bafen Tablets 5 mg

本品是一種骨骼肌鬆馳劑及抗痙攣劑，對於外傷、脊髓損傷，多發性硬化等所引起的肌肉痙攣、僵硬症狀，有快速鎮痙作用，能減輕其疼痛症狀。

#### 【成份】

Each tablet contains:

Baclofen.....5 mg

#### 【賦形劑】

Avicel、Starch 1500、Aerosil、Magnesium Stearate

#### 【藥理作用】

Baclofen 為 aminobutyric acid 的衍生物，藥理作用藉由使傳入神經末端毀極化，而抑制脊髓單突觸及多突觸的反射，阻斷神經衝動傳導，達到肌肉弛緩作用。

#### 【藥物動力】

Baclofen 能經由胃腸道快速、完全地吸收，口服後 2~4 小時內即能達到血中最高濃度，約 85% 的口服劑量以未變化型式排出，70~80% 排泄於尿中，80% 單劑量在 24 小時內排出，血漿半生期約 3~4 小時，約 30% 與蛋白質結合。

#### 【適應症】

限於脊髓和大腦疾病或損傷引起的肌肉痙攣。

#### 【用法用量】

本藥須由醫師處方使用。

成人初劑量 1 日 5~15mg，1~3 次飯後分服用，達標準用量 1 日 30mg 2~3 日，特殊情況可分次增量至 1 日

5~10mg，視症狀增減用量。

小兒初劑量 1 日 5mg，飯後 1~2 次分服用，達標準用量 (15-12 歲 5~25mg，11-7 歲 5-20mg，6-4 歲 5~15mg) 2~3 日，特殊情況可分次增量至 1 日 5mg，視症狀增減用量。

### 【注意事項】

1. 長期連續使用，突然中止會引起幻覺、錯覺、興奮狀態、痙攣發作等現象。所以必要中止服用時，宜慎重緩緩減量。
2. 會引起嗜眠，故投藥中患者，避免從事件有危險性之機械操作。

### 【禁忌】

對本劑有過敏症患者

慎重投與①癲癇及其既往歷患者②精神障害患者③消化性潰瘍患者④腎機能低下患者⑤肝障害患者⑥呼吸不全患者⑦高齡者⑧小兒(特別是癲癇及有既往歷患者)

### 【副作用】

1. 精神神經系：偶有嗜眠、頭痛、頭重、知覺異常(麻木)、筋肉痛、鎮靜、抑鬱、不眠、痙攣發作、意識障害、幻覺、情緒不安定、步行障害、酩酊感、耳鳴、舌運動障害、視調節障害
2. 依存性：幻覺、錯亂。
3. 循環器：罕有血壓降下、下肢鬱血、頻脈現象。
4. 消化器：偶有噁心、嘔吐、食慾不振、胃部不快感、下痢、便秘、腹痛、腹部膨滿感、口渴、胸結、罕有流涎、空腹感現象。
5. 泌尿器、生殖器：尿失禁、排尿困難、頻尿。
6. 過敏症：偶有發疹，這種症狀出現時，請中止服用。
7. 全身症狀：偶有脫力感、筋力低下、步伐蹣跚、頭暈、全身倦怠感。
8. 其他：偶有浮腫、胸部壓迫感、味覺異常、呼吸困難、肝機能檢查值異常(GOT，GPT 上昇)血糖值上昇。

9. 妊婦、授乳婦投與：動物實驗顯示，本藥會通過胎盤，經乳汁移行，故妊婦、有妊娠可能性婦人及授乳中婦人請勿服用。

**【相互作用】**

併用血壓降下劑，中樞神經抑制劑，攝取酒精等有增強作用，宜慎重投與。

**【其他】**

錐體外路系疾患(巴金森症候群，手足徐動症)無適當治療。

**【包裝】**

2 ~ 1000 粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

**【儲存條件】**

25℃以下儲存。

瑞士藥廠股份有限公司  
SWISS PHARMACEUTICAL CO., LTD.  
新市廠：台南市新市區中山路182號