

滋骨[®] 加強咀嚼錠

BIO-CAL[®]

PLUS Chewable Tablets

【藥理作用】

1. BIO-CAL[®] PLUS含磷酸鈣(Tribasic calcium phosphate)及維生素D₃ (Cholecalciferol)，能有效提供造骨所需之鈣、磷礦物質，及促進鈣、磷吸收之維生素D₃。
2. BIO-CAL[®] PLUS因主成分為Tribasic calcium phosphate，不會產生二氧化碳氣體(CO₂)，而其他碳酸鈣製劑在胃酸作用下均產生CO₂而導致脹氣之副作用。

【成分】每錠含 有效成分與含量

Tribasic calcium phosphate (equivalent to calcium 450 mg)..... 1203 mg
Cholecalciferol.....330 IU

其他成分(賦形劑)

Lactose spray-dried, Corn starch, FD&C red No.40 aluminum lake, Strawberry powder,
PEG 8000, Magnesium stearate, Talc, Sodium saccharin

【用途(適應症)】

預防鈣質與維生素D缺乏症，如骨質疏鬆症。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：
 1. 曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 1. 患有腎臟疾病的人(過多的鈣可能會造成腎結石)。
 2. 腎功能不全、牛奶鹼性中毒症(milk alkali syndrome)、腎結石、肉樣瘤病、副甲狀腺功能亢進的人。
 3. 患有肝臟疾病、心臟病、其他過敏或重大疾病的人。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 1. 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
 2. 接受醫師治療並服用藥品的人。
 3. 併用其他維生素及礦物質藥品或營養補充品。
- 四、其它使用上注意事項：
 1. 為防止兒童誤食，請妥善保管。
 2. 避免陽光直射。

3. 本藥含油性維生素，服用時勿超過建議劑量，油性維生素易發生蓄積。
4. 當使用大量磷酸鈣時，在每週或血鈣過多初次顯現時，應測定其血清中鈣濃度及腎功能。
5. 鈣鹽可能增強洋地黃苷類對心臟之作用。
6. 鈣鹽與四環素同時服用時亦可能干擾四環素之吸收。
7. 維生素及礦物質藥品僅可作為膳食攝取維生素及礦物質不足之輔助，不可取代均衡的飲食。
8. 本藥含礦物質，維持適當礦物質的平衡需要好的均衡飲食。長期補充高劑量的礦物質可能引起的副作用通常不清楚，且高劑量的單一礦物質會降低其他維生素或礦物質的生體可用率。

【用法用量】

一次一錠，每日2-3次，飯後使用，請嚼碎服用。

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	癢疹
腸胃道	噁心、嘔吐、腹瀉、便秘

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 若有發生上述之外不適情況。
2. 本藥過量時偶有高血鈣症、腎結石之病例發生。

【包裝】

4- 200錠鋁箔盒裝。

【類別】

醫師藥師藥劑生指示藥品。

【諮詢專線】

0800-222-166

【儲存條件】

請於25°C以下儲存。

藥 商： 台灣東洋藥品工業股份有限公司
地 址：115台北市南港區園區街3-1號3樓
製 造 廠：台灣東洋藥品工業股份有限公司六堵廠
廠 址：基隆市七堵區工建西路5號