

凱舒諾®人工淚液

Cationorm®, ophthalmic emulsion

衛部藥輸字 第 027403 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2022-05-06

本說明書請與藥劑一同保管，使用時請仔細閱讀。

Cationorm®是一種無菌、低張，不含防腐劑的人工淚液，呈乳液狀。Cationorm®用於暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感。這些症狀可能由外在因素導致，如空調、污染、搭乘飛機旅行、面對螢幕工作、屈光手術和配戴隱形眼鏡等；或可能是眼睛的病變，例如瞼板腺功能障礙。Cationorm®可滋養、潤滑並保護眼球表面。

使用Cationorm®可暫時緩解因配戴隱形眼鏡造成之不適。

成分

有效成分及含量

成分	含量	作用
Mineral oil	0.5%(5mg/ml)	暫時緩解因眼睛乾澀所引起的灼熱感與刺激感
Light Mineral oil	0.5%(5mg/ml)	

其他成分(賦形劑)

Tyloxapol, Cetalkonium chloride, poloxamer 188, Glycerol, Tromethamine, Tris-hydrochloride, Water for injections。

用途(適應症)

暫時緩解因眼睛乾澀所引起的灼熱感與刺激感。

使用上注意事項

- 有下列情形者，請勿使用
 - 曾因本藥成分引起過敏的人。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治
 - 正在接受醫師治療或醫師處方眼藥的人。
- 其他使用上注意事項
 - 為防止兒童誤食請妥善保管。
 - 避免陽光直射。
 - 使用前，請洗淨雙手。

- (4) 請依照藥品標示使用。
- (5) 以下情形，請勿繼續使用。
 - 1. 超過保存期限的眼藥水。
 - 2. 須一次使用完而未使用完之溶液。
 - 3. 藥液混濁、變色或出現異物時。
 - 4. 單劑量包裝發生損壞時。
- (6) 為避免污染藥品，使用時勿碰觸藥瓶瓶口，並避免與他人共用，或以其他容器盛裝。
- (7) 如需同時使用兩種以上眼藥時，請依下列方式使用，以免影響藥效：
 - 1. 使用眼藥水與眼藥膏時，請先使用藥水，間隔10分鐘以上再用藥膏。
 - 2. 使用兩種眼藥水時，建議間隔5分鐘以上，並建議將本藥放在最後使用。

用法用量

每次兩眼各1滴	每日1至4次
---------	--------

警語

- 1 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

發生部位	症狀
眼睛	眼部刺激感、眼睛疼痛、眼內異物感、眼睛發紅、眼睛搔癢、溢淚、眼部灼熱感、暫時性的視覺模糊、眼瞼發炎或眼瞼水腫。

- 2 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：


- (1) 連續使用三天症狀沒有改善。
- (2) 使用後產生眼睛劇痛、持續視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。
- (3) 若有任何不適情況產生。

包裝

塑膠包裝

每支Cationorm®單劑量包裝內含0.4 ml的無菌點眼液。

※ 使用說明



- 洗淨雙手
- 取出一支單劑量包裝
- 將單劑量包裝的頂部扭開
- 將頭後仰
- 輕輕將下眼瞼往下拉，眼睛向上看
- 將單劑量包裝置於眼睛上方，輕擠1滴藥水到眼睛裡，然後眨眼數次
- 單劑量包裝的頂端勿接觸到眼睛或眼睫毛。

單次使用。

單劑量包裝開封後必須立即使用，使用後即丟棄。

重複使用開封過的單劑量包裝，會有感染的風險。

儲存條件

將單劑量包裝置放在外盒內，30°C以下儲存

QR Code



製造廠

EXCELVISION (製造廠)

27 RUE DE LA LOMBARDIERE, Z.I.LA LOMBARDIERE, 07100
ANNONAY, FRANCE

SERVIPAC (包裝廠)

COURS OFFENBACH, ROUTE DE MONTELIER 26000 VALENCE,
FRANCE

藥商

台灣參天製藥股份有限公司

台北市中山區松江路126號9樓之1