



“杏輝”

PIC/S GMP 藥品

# 喜美 凝膠(喜普理諾) CIVIDOID Gel (Heparinoid) “Sinphar”

### 【成分】

有效成分及含量：每gm含：

Heparinoid Natural.....3mg  
(Heparin activity 250IU)

其他成分(賦形劑)：

Ethanol、Propylene Glycol、Carbomer、Monoethanolamine、  
Perfume(Ireine)、Flavor(Orange)、Water Purified、  
Sodium Bisulfite.

### 【用途(適應症)】

鈍物創傷後之血腫，淺層性靜脈炎之局部治療。

### 【使用上注意事項】

- 1、有下列情形者，請勿使用：
  - (1)曾因本藥成分引起過敏的人。
- 2、有下列情形者，請洽醫師診治：
  - (1)深部皮膚組織感染。
- 3、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
  - (1)兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- 4、其他使用上注意事項：
  - (1)為防止兒童誤食請妥善保管。
  - (2)避免陽光直射。
  - (3)勿超過建議使用量。
  - (4)塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡
  - (5)本藥限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得用於眼睛四周或黏膜。
  - (6)本藥勿使用於大面積之體表(以使用者的兩手掌面積為參考)或皮膚深部感染。
  - (7)使用後請勿覆蓋，以免增加副作用。
  - (8)不可將喜美凝膠塗抹於傷口或受傷的皮膚。
  - (9)如同所有含酒精成分的凝膠一般，投與喜美凝膠之後不可包紮。
  - (10)假若於電離子導藥療法，喜美凝膠應由陰極導入。

### 【用法用量】

用法用量	使用療程	
依據患部大小，每天二至三次，一般而言，擦上3至5公分長之藥品即足夠。	使用喜美凝膠應持續至病況緩解為止。	
	鈍物創傷的治療	持續10天以上
	淺層性靜脈炎	治療1-2週

### 【警語】

- 1.使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	過敏反應(如：紅、腫、起疹子)

- 2.使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (1)若有任何不適情況產生。
  - (2)持續治療兩週之後病情無法獲得改善，或停藥後再復發。
- 【包裝】1000gm以下鋁管、塑膠瓶裝。 衛署藥製字第023231號  
 【儲存】25°C以下保存。請放置於孩童不易觸及的地方。  
 【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

PIC/S GMP



杏輝藥品工業股份有限公司

SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.

台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號

84, CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG - SHAN SHINE, I - LAN, TAIWAN

服務專線：(0800)015151

website：http://www.sinphar.com

