

點而明眼用凝膠劑

CORNEREGEL

衛署藥輸字 第 021271 號
醫師藥師藥劑生指示藥品
版本日期 2022-05-06

本說明書包含重要的資訊，開始使用前請詳閱說明書

使用前必需依照仿單所述正確使用，或依照醫師、藥師或護理人員的指示使用。

Ø您可能需要再次閱讀，請保留此說明書。

Ø如果您有任何更多的問題，請諮詢醫師或藥師。

Ø如果使用本藥有任何的副作用，告知醫師或藥師，包括說明書上沒列出的任何可能發生的副作用。

Ø如果使用後感覺病情沒改善或更惡化，請告知醫師。

本說明書資訊包括：

1. Corneregel成分及用途
2. 使用上注意事項
3. 用法用量
4. 警語(可能的副作用)
5. 儲存方法和其它資訊

說明：

Corneregel是藥品，可幫助角膜和結膜傷口治癒。

1 成分

1.1 有效成分及含量

有效成分及含量：每公克含Dexpanthenol 50 mg

1.2 其他成分(賦形劑)

Cetrimide, Carbomer, Sodium hydroxide, Disodium edetate, Water for injections.

2 用途(適應症)

結膜炎、角膜炎、麥粒腫、結膜充血。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 曾因本藥成分引起過敏的人。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 正在接受醫師處方眼藥的人。

3.2.2 細菌、病毒或黴菌(真菌)感染眼睛的人。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.1 兒童、孕婦、可能懷孕或正計劃生育婦女及哺乳婦。

3.3.2 剛使用完或打算使用其它藥物的人。

3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 存放於25°C以下，避免陽光直射。

3.4.2 使用前，請洗淨雙手。

3.4.3 請依照藥品標示使用。

3.4.4 以下情形，請勿繼續使用。

3.4.4.1 超過保存期限。

3.4.4.2 開瓶28天後。

3.4.5 為避免污染藥品，使用時勿碰觸藥瓶瓶口，並避免與他人共用，或以其他容器盛裝。

3.4.6 如需同時使用兩種以上眼藥時，請依下列方式使用，以免影響藥效：同時使用眼藥水/眼藥膏/凝膠時，與本藥間隔應至少15分鐘，本藥應最後使用。

3.4.7 配戴隱形眼鏡時，請勿點用含防腐劑之眼用凝膠，因可能會沾污鏡片和與鏡片的材質不相容。

3.4.8 Corneregel含有保存劑Cetrimide，特別是長期和頻繁使用可能會引起眼睛刺激(灼熱、發紅、異物感)和角膜上皮損傷，長期治療最好使用不含保存劑的藥物。

3.4.9 使用凝膠時可能產生視線模糊，故使用後請勿立即駕車和操作機器直至視力恢復。

3.4.10 為防止兒童誤食請妥善保管。

3.4.11 用藥過量與任何已知的危險性無關，不會改善或惡化治療效果。

3.4.12 如果忘記使用，請不要使用雙倍劑量，應儘快按照說明書上所述相同的時間間隔與劑量來補足或依醫師指示使用。

4 用法用量

建議每日劑量	依病情嚴重程度，一天3-5次，每次1滴。
隱形眼鏡配戴者	使用前請將眼鏡取下，15分鐘後再戴上

5 警語

5.1 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
眼睛	刺激感如發紅、疼痛、異物感、淚水增加、發癢或結膜腫脹。
其他	過敏反應(如發癢、皮疹)。

5.2 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.2.1 連續使用三天後症狀沒有改善或更惡化。

5.2.2 若有任何其他不適情況產生。

6 包裝

5和10公克管裝。

7 使用說明

點眼時頭向後傾斜，用食指將下眼瞼往下拉，保持管子垂直，不要接觸到結膜囊，滴一滴進入結膜囊，輕閉眼睛，並緩慢轉動眼球使均勻分佈，用畢後栓緊瓶蓋。

新型的圓柱型蓋子可支撐管子垂直放置，隨時隨地都可以快速輕鬆的使用本藥，蓋子沒蓋上前，不得將管子隨便放置或儲存。

製造廠

吉地喜股份有限公司

新竹縣新豐鄉新豐村紅毛23之5號

DR. GERHARD MANN CHEM-
PHARM FABRIK GMBH

BRUNSBUTTELER DAMM 165/173 13581 BERLIN GERMANY

藥商

武昌貿易有限公司

台北市南京西路13號8樓