

衛署藥製字第24961號

“台灣東洋” **克痢黴素注射劑 200萬單位**

**T.T.Y Colimycin Injection 2,000,000U.
(Colistin methanesulfonate)**

【性 狀】

Colimycin (Sodium Colistin Methanesulfonate或Colistimethate Sodium) 為白色~淡黃色之粉末，其化學本質為鹼基性多肽類(Polypeptide)，在pH 2-10等廣範圍內，效果不變。

pH及滲透壓比(以注射用蒸餾水4ml當溶解劑)

規格	濃度	pH	滲透壓比
200萬單位	50萬單位/ml	6.6	0.6

【成 分】

每瓶含 Sodium Colistin Methanesulfonate...200萬單位(66.8mg Colistin base力價)

【適應症】

限用於一般抗生素無效，且具多重抗藥性之革蘭氏陰性菌之嚴重感染。

【用法用量】 本藥限由醫師使用。

肌肉注射或靜脈注射。

1.肌肉注射：

(1)腎功能正常之病患，2.5~5mg/kg/day分2~4次劑量注射，依年齡、症狀輕重適宜增減之。

(2)成人腎功能障害之病患使用sterile colistimethate sodium劑量推薦表如下：

RENAL FUNCTION	DEGREE OF IMPAIRMENT			
	Normal	Mild	Moderate	Considerable
Plasma creatinine, mg/100ml	0.7-1.2	1.3-1.5	1.6-2.5	2.6-4.0
Urea clearance,% of normal	80-100	40-70	25-40	10-25
DOSAGE				
Unit dose of sterile colistimethate sodium, mg	100-150	75-115	66-150	100-150
Frequency, times/day	4 to 2	2	2 or 1	every 36 hr.
Total daily dose, mg	300	150-230	133-150	100
Approximate daily dose, mg/kg/day	5.0	2.5-3.8	2.5	1.5

備註：注射本劑時，單一劑量為2.5~5mg/kg，注射之時距，依腎功能障害程度而定。

用法：將本劑66.8mg小瓶以2ml之注射用滅菌蒸餾水或生理食鹽水溶解，即每ml含有33.4mg之colistin base；溶解時，輕輕的旋轉小瓶，避免產生泡沫。

2.靜脈注射：

(1)直接間歇靜脈注射：一次為半日劑量，投與時間要超過3至5分鐘以上，緩慢注射，每12小時一次。

(2)靜脈點滴輸注注射：一次為半日劑量，投與時間要超過3至5分鐘以上。腎功能正常病患於靜脈點滴輸注開始1~2小時，以每小時5~6mg速率注射。腎功能障害病患依其障害程度，降低其注射速率。下列敘述之輸注液能與本劑配合使用。

- (1)0.9% Sodium Chloride inj.
- (2)5% Dextrose in 0.9% NaCl inj.
- (3)5% Dextrose inj.
- (4)5% Dextrose in 0.45% NaCl inj.
- (5)5% Dextrose in 0.225% NaCl inj.
- (6)Lactated Ringer's Solution.
- (7)10% invert sugar solution.

任何含本劑之輸注液須新鮮調配且24小時內使用完畢。

【注意事項】

一、曾對Colistin或Polymyxin B產生過敏症狀之患者，禁用本劑。

二、對有腎障礙之患者，使用本劑，宜慎重投與。

三、副作用：

- 1.腎臟：使用本劑少有腎障礙出現，在充分觀察中，若發現腎機能異常時，立刻停止使用本劑。
 - 2.神經系：使用本劑若有難聽、知覺異常、頭痛、發熱、嗜眠、運動失調、視覺障礙、神經筋無力、呼吸抑制等症狀出現時，中止使用本劑。
 - 3.消化道：使用本劑，偶有嘔吐、食慾不振、下痢等症狀出現。
 - 4.過敏症：使用本劑，若產生發疹等過敏症狀，立刻中止投與。
- 四、本劑對孕婦、授乳婦之安全性尚未確立，故若非必要，少用本劑。
- 五、藥物相互作用：本劑與下列藥物合用時，可能會產生神經肌肉阻斷作用，或呼吸抑制作用，故宜慎重投與：麻醉劑、肌弛緩劑、氨基糖苷類抗生素等。

【貯存方法】 室溫保存(25°C)。本劑注射用蒸餾水溶解後，室溫可保存7天，在冰箱不致凍結之狀態可保存2星期。

【有效期限】 請見藥品外包裝及瓶身標示

【包裝】 玻璃瓶注射小瓶裝，50小瓶以下盒裝

【製造廠】 中國化學製藥股份有限公司新豐工廠

【廠址】 新竹縣新豐鄉上坑村坑子口182-1號

【委託者】 台灣東洋藥品工業股份有限公司

【地址】 台北市南港區區區街3-1號3樓

【服務電話】 0800-086288

**SIZE:105x297mm
Pantone:Black**