

衛署藥製字第 042722 號
G-6522 Code No.31412

“溫士頓”

鈣佳磷錠

667 公絲
(醋酸鈣)

"Winston"

Calgalin Tablets 667 mg
(Calcium Acetate)

腎衰竭末期患者(肌氨酸酐清除率 < 30ml/min)，將會呈現磷酸鹽滯留及某種程度的高磷酸鹽血症，進而引起續發性副甲狀腺機能亢進導致骨質發育不全及軟組織鈣化。

為改善上述狀況，光靠減少攝食含磷酸鹽的食物或更有效的透析法是不足夠的。透析患者可吸收食物中的磷約達 40-80%，因此大部分需維持透析的腎衰竭患者均需要服用磷酸鹽結合劑來降低經由食物中吸取的磷酸鹽比例。本品所含主成分 Calcium Acetate 便是一種效果良好的磷酸鹽結合劑。

【主成分】

每粒本品錠劑含：

Calcium Acetate.....667 公絲

賦形劑：Sodium Starch Glycolate、Magnesium Stearate、Microcrystalline Cellulose、Maltol Dextrin、Pregelatinized Maize Starch、Orange Powder、Polyethylene Glycol 4000

【藥理作用】

本品錠片所含主成分 Calcium Acetate，是一種水溶性鈣，於中性 pH 值具高度溶解度，因此本品於進餐時服用後，在小腸中可結合食物中的磷酸鹽而形成水不溶性磷酸鈣，經由糞便排出體外，以達到控制腎衰竭患者血中磷酸鹽濃度值在可接受範圍內(< 6mg/dl)的醫療目標。本品經口服後，約有 30-40% 為體內所吸收。

【適應症】

腎衰竭末期的高磷酸鹽血症。

【用法用量】

對成人透析患者，建議起始劑量為每餐 2 粒本品錠劑。劑量可逐漸增加直到血中磷酸鹽值低於 6mg/dl 為止，只要 Hypercalcemia 不會出現。大部分患者的需用劑量每餐 3-4 粒本品錠劑，進餐時服用。

本藥須由醫師處方使用。

【禁忌症】

高血鈣症患者。

【注意事項】

- 1.服用本品治療時，不可同時服用他種鈣補充劑。
- 2.服用本品過量可能導致進行性高血鈣症，甚或嚴重到需急救處置。
- 3.服用本品的早期調整劑量期間，需每週二次監測血中鈣濃度及磷酸濃度值，二者乘積不得大於 66。
- 4.服用本品期間若有高血鈣症出現時，依其嚴重程度來決定降低本品劑量或停用本藥。
- 5.服用毛地黃 (Digitalis) 患者不可併服本藥，因為可能會造成心律不整。
- 6.服用本品治療時，應告知患者嚴格遵守本品用法用量之指示服用，並應避免服用非醫師處方之制酸劑。
- 7.服用本品可能降低 Tetracycline 的生體可用率。
- 8.除非清楚明白地需要服用本品，否則孕婦不建議服用本藥。
- 9.兒童服用本品之安全性及有效性尚未建立。

【副作用】

- 1.最常見的副作用是噁心。
- 2.偶有搔癢報告出現。

【包裝】

12-1000 錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。
1811-01

Made in Taiwan



溫士頓醫藥股份有限公司
台南市永康區鹽洲里仁愛街117號