

"生達"咳舒坦糖漿20毫克/毫升 (卡玻西典)

CARSTIN SYRUP 20MG/ML "STANDARD" (S-CARBOXYMETHYLCYSTEINE)

衛署藥製字 第 025309 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2022-05-06

產品特性：

- (1)本藥可以藉由補充含硫胺基酸，達到溶解痰、鼻涕以及膿等分泌物。
- (2)單獨或是合併使用其他止咳藥品，可緩解因黏稠的痰引起的長期咳嗽及不適。
- (3)能保護黏膜，進而對抗外來的刺激以及感染。
- (4)針對慢性支氣管炎，能減少咳嗽以及痰的產生以及鼻竇炎所引起的排膿。
- (5)具有芳香口味，適用於需要的孩童。

1 成分

1.1 有效成分及含量

每ml中含：S-Carboxymethylcysteine.....20mg

1.2 其他成分(賦形劑)

Citric Acid Anhydrous、Sodium Hydroxide、Strawberry Oil、Sodium Dehydroacetate、Sucrose、Menthol、Caramel、Orange Oil、Alcohol 95%、Purified Water、Edetate Disodium

2 用途(適應症)

減少呼吸道黏膜分泌的粘稠性。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 曾因本藥成分引起過敏的人。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 有肝臟，心臟疾病的人。

3.2.2 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾（慢性支氣管炎、肺氣腫）所引起的咳嗽及咳嗽有濃痰的人。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.1 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 為防止兒童誤食，本藥請妥善保管。

3.4.2 避免陽光直射。

3.4.3 使用前需振搖均勻，並使用所附量器量取藥量。

3.4.4 本品和含有抗生物質及Trimetoquinol HCl的糖漿混合時，外觀（顏色、澄清度）、味道等都會起變化，因此必要合併使用時，請分開投與。

3.4.5 不得與含酒精飲料併用。

4 用法用量

年齡	劑量	使用次數
未滿5歲	0.5毫升(10mg)/公斤	每天3次
5歲以上未滿12歲	10-15毫升	
成人及12歲以上	25毫升	

5 警語

5.1 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
皮膚	發疹、紅斑
消化器官	有時會有噁心、食慾不振、胃部不適感、腹部膨脹感、腹瀉、口渴
其他	有時會有搔癢感、心悸、鼻水流不停、全身壓迫感

5.2 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.2.1 若有任何不適情形產生。

5.2.2 有高燒、出疹、持續性頭痛、及持續達一星期以上的咳嗽，或有復發情形。

6 包裝

60~4000ml塑膠瓶、桶裝

7 儲存方式

貯存於25°C以下。

8 類別

醫師藥師藥劑生指示藥品

製造廠

生達化學製藥股份有限公司二廠 台南市新營區開元路154號

藥商

生達化學製藥股份有限公司 台南市新營區土庫里土庫6之20號