

鈣離子拮抗劑 卡迪爾

錠 30毫克 衛署藥製字第 G-3887
036966 號

錠 60毫克 衛署藥製字第 G-4594
038422 號

Cartil Tablets(30mg、60mg)
(Diltiazem Hydrochloride)



930002

【成分名 (中文名)】

Diltiazem HCl (鹽酸迪太贊)

【劑型、含量】

錠劑：每錠含Diltiazem HCl (30mg、60mg)。

【臨床藥理】

1. Diltiazem HCl是一種鈣離子拮抗劑，其藥理特性相似於Nifedipine，主要作用為抑制心臟血管系統細胞外鈣離子的注入，擴張血管，增加冠狀血流量(但並不改變血液中鈣離子濃度)，同時抑制心肌及血管平滑肌的收縮，擴張冠狀血管末梢血管，降低血壓減少心臟負荷。

2. 吸收、分佈、代謝：

口服本藥之生體可用率(比較注射而言)為40%。本藥大部份經由肝臟代謝，有2-4%以未改變之形式經由尿排泄。本藥有70-80%會和血漿蛋白結合。口服本藥30-120mg後，30-60分鐘內可在血漿中測得，而在2-3小時內可得最高血中濃度。本藥口服單一或多次劑量其血中半衰期約為3.5小時。本藥代謝物desacetyl diltiazem大約佔有10-20%，其冠狀動脈擴張之強度約為Diltiazem的25-50%。本藥之治療血中濃度範圍為50-200ng/ml。尚無資料顯示本藥之排泄或代謝物會對肝或腎有損傷。

【適應症】

狹心症；輕度至中度之本態性高血壓。

【用法用量】

本藥須由醫師處方使用。

1. 狹心症

通常成人1次30mg，1日服用3次。

症狀較重時，可增量至1次60mg，1日服用3次。

2. 輕度至中度之本態性高血壓。

通常成人1次30~60mg，1日服用3次。

又，依年齡、症狀適宜增減用量。

(參考)[日本藥局方第11版所載極量: Diltiazem HCl 1次90mg。1日360mg(口服)]。

【注意事項】

1. 本藥由腎臟及膽汁排泄，故若長期使用或腎、肝功能不全之患者，使用本藥時應隨時監視之。
2. 懷孕婦女：懷孕或可能懷孕婦女使用本藥之安全性尚未建立。
FDA Pregnancy Category (懷孕用藥級數)：C

3. 哺乳婦女：哺乳婦女使用本藥之安全性尚未建立。
4. 幼兒：幼兒使用本藥之安全性尚未建立。
5. 使用上注意：
 - (1)心傳導：本藥延長房室結之傳導，但除非病患有竇房結疾患，否則並不緩慢竇房結之跳搏。
 - (2)心臟衰竭：本藥雖有降低心肌力，但對正常心室並無影響。臨床上若使用於心室受損患者，則避免使用，尤應避免與 β -阻斷劑併用，本藥使用於此類病患時亦應避免劇烈運動。
 - (3)低血壓：併用其他降血壓劑時應注意。
 - (4)急性肝受損：此類作用少見。
6. 本藥並不能阻止急性狹心症發作。

【交互作用】

β -阻斷劑及毛地黃與本藥併用會相互增加作用。

【副作用】

1. 時有水腫(2.4%)，頭痛(2.1%)，噁心(1.9%)，眩暈(1.5%)，發疹(1.3%)，無力感(1.2%)，房室阻斷(1.1%)。
2. 少有(少於1%)。
 - 心血管系統：顏面潮紅、心律不整、低血壓、心跳緩慢、心悸、心臟衰竭、暈厥。
 - 神經系統：感覺異常、神經過敏、嗜睡、顫抖、失眠、幻覺、健忘。
 - 胃腸系統：便秘、消化不良、腹瀉、嘔吐、鹼性磷酸鹽、SGOT、SGPT、LDH等的中度提高。
 - 皮膚：：搔癢，紫斑、蕁麻疹、對光敏感。
 - 其他：多尿、夜尿。

【儲存條件】

本藥應儲存於冷暗乾燥處，避免光熱照射。

【賦形劑】

Eudragit L100, Hydrogenated oil, Lactose monohydrate, PEG 6000, Magnesium stearate.

【包裝】

4 - 1000 錠瓶裝；鋁箔盒裝。

健喬信元醫藥生技股份有限公司

藥商地址：303新竹縣湖口鄉工業一路6號
製造廠名：健喬信元醫藥生技股份有限公司 健喬廠
製造廠址：303新竹縣湖口鄉工業一路6號