


“信東” **賜福** 膠囊 250公絲 (西華克樂)

**Cero Capsules 250mg (Cefaclor)**

“信東”賜福主成份Cefaclor其化學結構：



化學名：3-chloro-7-(D-2-phenylglycinamido)-3-cephem-4-carboxylic acid，為白-微黃白色晶形粉末，略溶於水，屬合成頭孢子菌素類之一種廣效性抗生素，其殺菌力為抑制細菌細胞壁之合成。口服後吸收良好迅速，故給藥時，可不需考慮進食與否。經口投與後，無論成人或小孩，一般於6小時內，約70%自尿中排出。

**【成分】**

主成分：Each capsule contains：

Cefaclor (as monohydrate).....250mg(Potency)

賦形劑：Corn Starch、Sodium Starch Glycolate、Hydroxypropyl Cellulose Low Substitutive、Magnesium Stearate、Capsule Shell(含 Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Brilliant Blue FCF、Erythrosine、Titanium Dioxide)。

**【適應症】**

甲族乙型溶血性鏈球菌、葡萄球菌、肺炎雙球菌、大腸桿菌、奇異變形桿菌、克雷氏肺炎桿菌、嗜血桿菌、淋球菌等病原菌所引起之感染。

**【效能】**

咽喉炎、扁桃腺炎、支氣管炎、肺炎、膀胱炎、腎盂腎炎、蜂窩組織炎、毛囊炎、癰、癤、皮下膿瘍、淋巴節炎、乳腺炎、麥粒腫、牙周組織炎、牙冠周圍炎、顎炎、猩紅熱、中耳炎。

**【用法·用量】**

成人之一般劑量為250mg，每8~12小時一次。治療支氣管炎和肺炎的劑量為每日服用3次，每次250mg。兒童之一般劑量為每日20mg/kg，每8~12小時一次。治療支氣管炎和肺炎的劑量為每日20mg/kg，分為每日3次服用。

對較嚴重之感染或感受性較低之細菌引起之感染症，其劑量可加倍。

腎功能不全者，通常可不必調整劑量。

此藥須由醫師處方使用，經口投與。

**【注意事項】**

(1)禁忌：對頭孢子菌素類有過敏性之患者，禁止使用本藥。

(2)慎重投與：1.對青黴素過敏者。

2.本人及近親(父母、兄弟、姊妹)，有氣喘、發疹、蕁麻疹等過敏性患者。

3.高度腎障礙患者。

4.經口投與攝取不良或全身狀況欠佳患者。

(3)一般注意：投藥後如有過敏反應發生，應即停藥。必要時並應給與適當藥劑，如升壓胺，抗組織胺或皮質類固醇。

(4)小心使用於未滿月之嬰兒，及患有胃腸疾患的患者，尤其是有結腸炎之患者。

(5)副作用：間有搔癢症、蕁麻疹、麻疹樣疹等過敏性反應、腹瀉、SGOT、SGPT輕微昇高等發生。

**【包裝】**

2~1000粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

衛署藥製字第036082號G-3366



信東生技股份有限公司觀音廠  
桃園市觀音區國建一路1號