

“生達” **即舒敏** 糖漿 **Cytadine** Syrup
0.4毫克/毫升 0.4mg/ml
“Standard”

本品是一種具抗乙醯膽鹼和鎮靜作用之糖漿劑，可加強抗組織胺和Serotonin antagonist的作用，並有antimuscarinic和鈣離子阻斷效果，對一般之過敏反應，有緩解之療效。

主 成 分:每5ml含：

Cyproheptadine Hydrochloride.....2mg

適 應 症:

皮膚疾患引起之搔癢(濕疹、皮膚炎、皮膚搔癢症、藥物過敏反應) 枯草熱、蕁麻疹、過敏性鼻炎、血管運動性鼻炎、感冒上氣管炎引起之咳嗽、鼻涕。

用法用量:本藥須由醫師處方使用。

劑量必須因人而異，因一次服量有效時間為4~6小時，故每日所需總量應分三次或較多次數服用，以供繼續療效。本糖漿除供小孩服用外，成人如對吞服藥丸感困難時，亦可使用之。

小童劑量(2~6歲)：

開始用時，每日三次，每次2毫克(5c.c)視于病者之反應而增減用量，至適可為止。如需服用四次時，每日劑量以不超過12毫克為限。

(6~14歲)：

通常為每日三次，每次4毫克(10c.c)，根據病者之反應而增減劑量至適可為止。如每日須服四次，則可於臨睡前多服一次。每日總劑量以不超過16毫克為限。

成人劑量：

每日劑量為4毫克至20毫克。多數病者每日需用12~16毫克但間或有須較高劑量須用32毫克，始獲療效。起初服用時劑量為每日三次，每次4毫克(10c.c)其後視于病者之反應而增減至適當劑量為止。每日之總劑量以不超過32毫克為限。(所附量杯為20ml)

禁 忌 症:

1. 新生兒、早產兒、授乳之母親。
2. 對Cyproheptadine或MAOI敏感者。
3. 青光眼、前列腺肥、幽門狹窄、氣喘、年老虛弱之病人。

注意事項:

1. 2歲以下孩童或虛弱之老年人，最好不要服用本品。
2. 小孩或嬰兒服用過量，會造成嗜睡、中樞神經抑制、痙攣、和死亡。
3. 老年人服用本品容易造成眩暈、鎮靜和低血壓，應注意。
4. 服用本品後，應避免操作機械或開車。

交互作用:

1. 和酒精或中樞神經抑制劑併用具相加作用。
2. MAO inhibitors會延長和加強本品抗乙醯膽鹼效果。

副 作 用:

1. 精神神經系：嗜睡、倦怠感、頭痛、眩暈、興奮、錯亂。
2. 消化器：口渴、噁心、下痢、腹痛。
3. 過敏症：發疹、水腫、蕁麻疹、對光敏感。
4. 血液：紫斑、血小板減少、白血球減少。
5. 其他：頻尿。

貯存方式:

1. 本品應置於兒童不及之處。
2. 請密封儲存於 25°C 以下，請勿冰存並避免陽光直射。

賦 形 劑:

Sodium Benzoate、Sucrose、Sucralose、Citric Acid Anhydrous、Menthol、Food Yellow No.4、Sodium Citrate、Apple Flavor、Alcohol 95%、Water Purified

包 裝:

20~4000毫升HDPE塑膠瓶裝。

衛署藥製字第014422號 Code No.LC-14 2214530

藥商： PIC/S GMP藥廠
生達化學製藥股份有限公司
台南市新營區土庫里土庫6之20號

製造廠： PIC/S GMP藥廠
生達化學製藥股份有限公司二廠
台南市新營區開元路154號