

敵 癬 抗黴乳膏 1%
DECENT CREAM 1%

衛署藥製字第044505號

【組成】

本品一公克含：

Naftifine HCL 10mg

【性質】 Naftifine 為一種新的局部抗黴菌劑，於極低濃度下，對皮黴菌，具殺菌作用，對念珠菌種具制菌作用。

本品對 G(+)、G(-) 細菌具有局部殺菌效果。

【賦形劑】 Glyceryl Stearate , Cetyl Alcohol , Span 60 , Tween 30 ,
Benzyl Alcohol , Carbopol 940 , Propylene Glycol ,
Triethanolamine , D. I. Water ,

【適應症】 (1) 髮癬菌種、小芽胞癬菌種、毛囊狀表皮黴菌在皮膚及其附屬組織所引起之感染。

(2) 表皮念珠菌病。

(3) 甲黴菌病。

(4) 花斑癬。

【給藥與劑量】

(1) 皮膚感染：除非醫師另有指示，本品每天一次薄薄地塗擦於患部，加以磨擦（最好在就寢前）每次塗藥範圍，包括可見到的患部皮膚，及其周邊一英吋寬的區域在內。

(2) 指（趾）甲感染：被感染之指甲須儘可能地剪短，本品每日一次塗擦於患部，並磨擦使易吸收也可再加密封式繃帶來包住指甲部。

(3) 一般建議：

患部（皮膚或指甲）在用藥前須以溫水洗淨並完全乾燥，確實而足夠時間地投予 Decent，對於是否可獲得成功的治療，是非常重要的，為預防復發，在所有疾患症狀消失後，必須再持續治療約二星期。

治療期間因各疾患而異通常：

一皮黴菌感染約二～四週，嚴重時四～八週

一表皮念珠菌病四週

一甲黴菌病可長達六個月

一花斑癬二週

本藥須由醫師處方使用。

【耐藥性】 Decent 具良好之耐受性，局部給藥後，並不影響全身作用。

(禁忌) 對 Decent 或其他成分過敏者。

(注意) 本品僅用於局部皮膚用，不應使用在急性發炎或開放傷口，不可用於眼部。

【交互作用】 未知。

【副作用】 極少數病例可能有中度，但具完全可逆之局部刺激皮膚反應，如灼熱感、乾燥，只有極少數須要停藥。

【包裝】 1000公克以下鋁管裝、塑膠瓶裝。

委託者：明則實業有限公司

台北市光復南路22巷40號

製造廠：歐怡生技醫藥股份有限公司

新竹縣湖口鄉光復路1號

9163020.01