

100mm

確認簽名:

達爾能持續性膠囊120毫克

Diltelan Capsules 120mg

Calcium Blocker

衛署藥製字第 048128號

[主成分]: 每膠囊含Diltiazem Hydrochloride 120mg。

[適應症]: 高血壓。

[賦形劑]: Sugar Spheres, Povidone, Talc, Hydroxypropyl methylcellulose, Polyethylene glycol, Ethylcellulose, Eudragit E100, Dibutyl phthalate and Magnesium Stearate.

[膠囊殼成分]: Gelatin, Sodium lauryl sulfate, Purified water and Titanium dioxide.

[用法用量]: 本藥須由醫師處方使用，口服投與，請勿咀嚼。
成人劑量：每天一次90mg，必要時，可視個人反應逐漸增加至每天一次360mg。
年長者及肝腎受損者劑量：
初劑量每天一次90~120mg，且必須測量其心跳速度，當其心跳降至每分鐘50次以下時，即不可再增加劑量。

[特性]: 本品為鈣離子拮抗劑，有良好的吸收，且經過肝臟代謝成為有效之代謝物。其半衰期為6~8小時，本藥大部份主要經過糞便排出體外，少數經由尿液排出。

[配合禁忌]: 孕婦及可能懷孕之婦女、竇房結病變患者、中至重度房室結阻斷患者、嚴重心跳徐緩者。

[副作用]: 一般而言，Diltiazem類產品很少有副作用，即使有副作用，也是很輕微的。曾有報告證明其副作用有：心跳徐緩、輕微房室結阻斷、踝關節水腫、噁心、頭痛、皮膚紅疹、手指腫脹。

[警語]: 輕度心跳徐緩P-R間期過長的病人應密切觀察。Diltiazem的心肌抑制作用不強，所以對心室功能不全的病人有很好的耐受性。Diltiazem對大多數患者單獨治療即可得到良好的效果。同時與β-阻斷劑併用時，治療初期二者的劑量要適度調整，且要隨時監視其心跳速度。對已知傳導缺陷之病人，不應接受β-阻斷劑與Diltiazem的混合治療。另外Diltiazem會使Digitalis glycosides的血中濃度增加。本藥品含DBP (Dibutyl phthalate)，經動物試驗顯示DBP於高劑量下會對於生殖器官的發育產生不良反應。建議懷孕婦女及哺乳期婦女僅在絕對必要的情況下，才服用含DBP的藥品。

[包裝]: 2 ~ 1000 粒鋁箔盒裝

[儲藏]: 本品應於25°C以下避光貯之。

製造廠: **南光化學製藥股份有限公司**

台灣·台南市新化區中山路1001號、1001-1號

委託者: 友華生技醫藥股份有限公司

台北市復興南路一段368號7F

(02)2755-4881

051619-01
26200000000N40

194mm