



“瑞士”  
**得喜寧** 膠囊（去氧經四環素）  
**Doxynin Capsules “SWISS” (Doxycycline)**

本品為抗菌劑，療效優於舊四環素類抗生素，並具有若干獨特之優點如次。

- ①本品對類脂質溶解度極高，藥物分佈於各組織之濃度甚高，故為一強而有效之抗生素。
- ②本品與其他四環素類不同，吸收完全，抗菌力持久。停藥24~36小時後仍有抗菌效能。
- ③食物、牛乳之消化，對本品吸收之影響不大，故不必顧及用膳時間。

**【成份】**

Each capsule contains :

Doxycycline Hydrochloride .....100mg (potency)

**【賦形劑】**

Lactose、Magnesium Stearate

**【膠囊成份】**

Gelatin、Titanium Dioxide、Brilliant Blue FCF、Tartrazine、Sodium Lauryl Sulfate

**【適應症】**

對革蘭氏陽性菌及陰性菌所引起之感染症。

**【作用】**

- ①肺炎：肺炎球菌、鏈球菌、葡萄球菌、流行性感嗜血桿菌及肺炎桿菌之感受菌株所引起之單葉及多葉肺炎及支氣管肺炎。
- ②其他呼吸道感染症： $\beta$ -溶血性鏈球菌、葡萄球菌、肺炎球菌及流行性感嗜血桿菌之感染菌株所引起之咽炎及支氣管炎。
- ③耳鼻喉科：感受菌所引起之扁桃腺炎、中耳炎及竇炎。
- ④急性生殖泌尿道感染：克雷白氏-產氣桿菌類、大腸菌、變形桿菌、帶形菌、腸球菌、葡萄球菌及鏈球菌之感受菌株所引起之腎盂腎炎、膀胱炎、尿道炎、膀胱三角炎及前列腺炎。
- ⑤淋菌性尿道炎：淋病奈瑟氏菌所引起之尿道炎。（以每日三次，每次100mg，服藥一日即能收效。）
- ⑥軟組織感染：金黃葡萄球菌、白色葡萄球菌、鏈球菌、大腸菌、帶形菌、變形桿菌及克雷白氏-產氣桿菌類之感受株所引起之膿胞節，蜂窩織炎、膿炎、外傷及手術後感染。甲溝炎。（治療軟組織感染時其所需外科手術應與本品治療同時實施。）
- ⑦粉刺及囊腫性痤瘡。
- ⑧產科感染：急性產褥感染

## 【用法用量】

本藥須由醫師處方使用。

一般感染：成人於治療第一日服用二粒，早晚分服之，隨後每日服一粒，繼續服用至徵候及熱度消失為止。嚴重病例如慢性尿道感染，日服二粒，早晚分服之。

（氫氧化鋁凝膠可能減低四環素類之吸收，故避免同時服用。）

## 【注意事項】

1. 有肝障害及食道通過障害之患者須慎重投與。
2. 副作用：
  - a. 肝臟：偶有出現 S-GOT，S-GPT 值上昇等肝機能檢查值之異常。
  - b. 消化器：偶有食慾不振、噁心、嘔吐、腹痛、下痢、口內炎、舌炎、肛門周圍炎等症狀。
  - c. 血液：偶有血小板減少，嗜中球減少，嗜酸球增多等症狀出現。
  - d. 過敏症：偶有發熱、發疹、蕁麻疹、光線過敏等過敏症狀，出現時停止使用
  - e. 對經口食事攝取不良之患者及高齡、衰弱之患者，投與本品時會出現 Vit. K 缺乏症（低 Prothrombin 血症，出血傾向等）及 Vit. B 群缺乏症（舌炎、口內炎、食慾不振、神經炎等）。
3. 新生兒、乳幼兒之投與：
  - a. 出現牙齒着色，琺瑯質形成不全，骨骼發育不全等，故只在其他藥劑無效時，才考慮使用本品。
  - b. 偶有出現頭內壓上昇之現象（嘔吐、大凶門膨隆、頭痛、血乳頭等）。
4. 孕婦之投與：妊娠後半期投與本品，胎兒會有一時性骨骼發育不全、牙齒著色、琺瑯質形成不全等現象。又經動物實驗認為對胎兒具有毒性，故孕婦或可能懷孕之婦人投與本品時須判斷在治療上之有益性大於危險性時才使用。
5. 相互作用：與鈣（Ca），鎂（Mg），鋁（Al）及鐵（Fe）劑併服時會減弱本品之藥效
6. 應用上之注意：

口服時若停留在食道中崩解時，稀有引起食道潰瘍，故須多以開水送服，就寢前服用尤須注意。

## 【包裝】

3~1000粒罐裝、盒裝。

瑞士藥廠股份有限公司  
SWISS PHARMACEUTICAL CO., LTD.  
新市廠：台南市新市區中山路182號