

"正和"

痛安錠

ERGOCAFE Tablets "C.H."

⊗ 成分：Each tablet contains:

Ergotamine Tartrate.....1mg
Caffeine Anhydrous.....100mg

⊗ 性狀：

Ergotamine tartrate對顱外動脈脹大具有特殊之血管緊張作用，功能消退偏頭痛發作及其他血管性頭痛症，咖啡因Caffeine功能加速及增進麥角胺Ergotamine tartrate在腸內吸收。

⊗ 適應症：血管性頭痛，如：偏頭痛、組織胺性頭痛。

⊗ 用法用量：一有發作先兆，應即用Ergocafe。

首次治療：

初次量：Ergocafe兩錠，在半小時內仍未見效時，應再服一錠，必要時每隔半小時可照量服用一次。

小孩(6~12歲)：初次量Ergocafe一錠：以前次發作所需總量為根據，開始劑量可能增至三錠，必要時每半小時可再用藥一次，以下列最高劑量為限：

每次發作及每日最高劑量：

成人：Ergotamine tartrate 6mg, 相當於6錠之Ergocafe

小孩：Ergotamine tartrate 3mg, 相當於3錠之Ergocafe

每星期最高劑量：

成人：Ergotamine tartrate 10mg, 相當於10錠之Ergocafe

小孩：Ergotamine tartrate 5mg, 相當於5錠之Ergocafe

本藥須由醫師處方使用。

⊗ 注意事項：

禁忌：

凡有周圍性血管病、管腔閉合性血管病、冠狀動脈性心病、嚴重性高血壓、肝腎機能不全、妊娠期及授乳期、膿毒性症狀等。

注意：

如見有手指或足趾刺痛之徵狀，應立即停止用藥，並向醫師就診。

副作用：

神經過敏之病者或未經醫師指導而延長治療後，可能發生噁心及噁吐，感覺異常，四肢疼痛及虛弱。

⊗ 儲存：儲存於25°C以下，避光存放。

⊗ 包裝：4-1000錠塑膠瓶裝。

⊗ 賦形劑：Powdered Cellulose、Lactose Monohydrate、Primojel、Magnesium Stearate、HPC-L、Sunset Yellow FCF、Indigocarmine、Caramel

衛署藥製字第019210號

正和製藥股份有限公司新營廠

台南市新營區新工路23號(新營工業區)