

雌激素缺乏治療劑

益斯得錠 2 毫克

Estrade Tablets 2MG



928004

[成分] 每錠中含有

Estradiol Valerate 2mg.

[適應症]

更年期症狀及停經後引起的各種病症、卵巢切除之患者(因疾病或腫瘤而將卵巢切除)。

[用法·用量]

開始治療時，通常成人一天 2mg，20~21 天後至少停藥一星期，然後將劑量減至一天 1mg。
本藥須由醫師處方使用。

[禁忌]

乳房及子宮之惡性腫瘤，懷孕。

[警語]

心血管疾病如瓣膜疾病，凝血異常，嚴重肝功能障礙須謹慎投與。
經期間出血時應查出隱藏的病因。

[注意]

若有動脈血管堵塞之虞，會隨著吸煙而加重。
突發的症狀伴有急性併發症必須停止治療：嚴重性頭痛，視覺障礙，血壓增高。

[藥品相互作用]

不建議併用下列藥物：
酵素誘導劑：抗痙攣(Carbamazepine、Phenobarbital、Phenytoin、Primidone)，
Rifampicin，Griseofulvin，併用上列藥物會減少 Estradiol Valerate 治療效果。

[副作用]

噁心、頭痛、體重增加、乳房脹痛。

[貯存條件]

本品應貯於25°C以下及兒童伸手不及之處。
使用前請詳閱說明書，注意遵守使用說明。

[賦形劑]

Lactose Monohydrate, Corn Starch, Povidone K-30, Talc, Magnesium Stearate.

[包裝]

2~1000 錠，塑膠瓶裝；鋁箔盒裝。

衛署藥製字第 G-5264 號
039822

健喬信元醫藥生技股份有限公司

藥商地址：303新竹縣湖口鄉工業一路6號
製造廠名：健喬信元醫藥生技股份有限公司 健喬廠
製造廠址：303新竹縣湖口鄉工業一路6號