

請由此處剪開



↑ 開封後請速將拉鍊密閉

德山 菲比樂膠布

水性藥膠布

外

FLURBI PAP "D.S."

無臭性

4枚入

用

(1枚14cm X 10cm)



肌肉酸痛

腰痛

運動傷害

肩痛

關節炎

全方位
滲透力強



水性貼布·清涼透氣
撕貼容易
能滲入皮膚組織及關節患部
可促進血液循環
鎮痛消腫藥效溫和




4 712284 501451



德山製藥股份有限公司
DERSAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

請由此處剪開



開封後請速將拉鍊密閉

德山 菲比藥膠布

FLURBI PAP "D.S."

無臭性

4枚入

(1枚14cm X 10cm)

外用

本品為一水性貼布清涼透氣、撕貼容易，能滲入皮膚組織及關節患部，可促進血液循環，鎮痛消腫，藥效溫和。對於關節炎、肩、腰、腿部肌肉酸痛及運動傷害之發炎紅腫，均有良好的療效。

適應症：變形性關節症、肩關節周圍炎、肌腱鞘炎、腱周圍炎、上腕骨上髁炎、筋肉痛、外傷後之腫脹、疼痛等諸症狀的鎮痛、消炎。

成分：每片10g膏體(14cm×10cm 不含不織布、離形紙)含：Flurbiprofen 40mg
賦形劑：Purified Water, Gelatin, Tartaric Acid, Alcohol, L-Menthol, Polysorbate 80, Sorbitan Sesquioleate, Glycerin, Kaolin, Titanium Oxide, Methyl Paraben, Sodium Polyacrylate, Sodium Carboxymethylcellulose, Sorbitol Solution 70%, Polyacrylic acid, Nikasol TS-620

用法用量：1. 通常一日一次貼於患部，慢性病患者或重症者，一日換貼2~3次，可切割成適當大小，剝去表面薄紙，貼於患部。2. 流汗時，請先將患部擦乾再予貼上。
3. 於關節等易脫落之部位，可用護膠或伸縮繃帶固定。

※ 儲存於30°C以下

【本藥須由醫師處方使用】

注意事項：

1. 請勿使用於下列部位：(1)眼睛四周，粘膜處。(2)濕疹、癢疹、傷口等部位。
2. 對藥物化粧品等有過敏症狀者(例如發疹、潮紅、搔癢、癢疹等)使用前需請教醫師或藥師。
3. 兒童須在保護者指導監督下，才可使用。
4. 本品應置於兒童不易拿到之處。
5. 避免日光直射，貯存於乾燥陰涼處。
6. 使用後將開封鍊條壓平或將開封口壓折，以防空氣進入，確保品質。
7. 2歲以下兒童之使用須詢問醫師或藥師。

製造批號：
保存期限：



製造廠：
德山製藥股份有限公司
DERSAN PHARMACEUTICAL CO., LTD.
嘉義縣民雄工業區中山路38號
服務專線：0800-775589

衛署藥製字第043493號