

好視多

Foxone

G-7757 Code No.31311
衛署藥製字第 045145 號
本藥須由醫師處方使用

眼用懸浮液
0.02%

Ophthalmic Suspension
0.02%

1. 性狀：

- 1.1 有效成分及含量：Each ml contains：
Fluorometholone.....0.2 mg
- 1.2 賦形劑：Benzalkonium Chloride、Sodium Chloride、
Sodium Phosphate Monobasic 2H₂O、Sodium Phosphate
Dibasic 12H₂O、Disodium Edetate、Polyvinyl Alcohol、
Tween 80、Water For Injection

- 1.3 劑型：點眼液劑。
1.4 藥品外觀：乳白色懸浮液。

2. 適應症：眼瞼炎、結膜炎、角膜炎、強膜炎、上強膜炎、虹彩炎、虹彩毛 樣體炎。

3. 用法及用量：

- 3.1 用法用量：使用前請徹底振搖。
滴入 1~2 滴在眼結膜囊中，每日 2~4 次。在最初的 24~48 小時這段
期間，劑量可增加至每小時 2 滴。使用時壓住淚管，可將藥物被身體
吸收的可能性降至最低。

4. 禁忌：急性表面單純疱疹性角膜炎、牛痘、水痘或眼球角膜及結膜因其他 病毒所造成的疾病、眼部組織的黴菌感染、眼結核、對 Fluorometholone 過敏患者。

5. 警語及注意事項：

- 5.1 警語/注意事項：
- (1) 敏感患者長期使用可能會造成眼內壓升高，導致視神經受損，視力
衰退，視野變窄，形成囊下後部白內障或因眼部組織釋出黴菌或病
毒而造成二次感染。
 - (2) 許多眼疾及長期使用皮質類固醇會導致角膜和鞏膜變薄。
 - (3) 使用皮質類固醇在變薄的角膜或鞏膜組織上可能會引起穿孔。
 - (4) 類固醇會遮蔽或惡化急性化膿性而未作治療的眼部感染。

- (5) 曾有單純疱疹性角膜炎病史的患者使用類固醇應格外謹慎；並經常
進行強制性的裂隙燈顯微檢查。
- (6) 局部、長期地使用類固醇特別容易發生角膜黴菌感染，因此，使用
中或曾使用過類固醇的患者一旦發現任何頑固的角膜潰瘍，切勿忽
略黴菌入侵的可能性。
- (7) 需經常檢查眼內壓。

5.5 其他注意事項：

- (1) 使用本產品時，應避免瓶子內塞接觸眼睛及眼瞼。並應避免用手或
身體其他部位觸碰瓶子內塞。
- (2) 使用完畢或不用時，應鎖緊瓶蓋，以防止污染。
- (3) 請於開瓶後四星期內使用完畢，逾期未用完的部份請丟棄不用。

6. 特殊族群注意事項：

- 6.1 懷孕：根據動物試驗報告，使用 Fluorometholone 會導致動物胎兒畸
形。由於在孕婦使用上的安全性尚未確立，故對於孕婦或可能懷孕的
婦女及授乳婦人不要投與。
- 6.2 哺乳：請參閱 6.1 懷孕注意事項。
- 6.3 有生育能力的女性與男性：請參閱 6.1 懷孕注意事項。
- 6.4 小兒：對 2 歲以下嬰幼兒使用的安全性及有效性尚未確立。

7. 交互作用：目前尚無資訊。

8. 副作用/不良反應：

- 8.1 臨床重要副作用/不良反應：
 - (1) 眼內壓過高可能會造成青光眼，視神經受損，使視力衰退或視野變
窄，形成囊下後部白內障及造成復原遲緩。
 - (2) 外用皮質類固醇曾有下列報告：
 - a. 從眼部組織釋出的致病菌造成眼部二度感染。
 - b. 由於角膜或鞏膜變薄而導致眼球穿孔。

9. 過量：目前尚無資訊。

10. 藥理特性：目前尚無資訊。
11. 藥物動力學特性：目前尚無資訊。
12. 臨床試驗資料：目前尚無資訊。
13. 包裝及儲存：
 - 13.1 包裝：100 ml 以下塑膠瓶裝。
 - 13.2 效期：如外包装所示。
 - 13.3 儲存條件：避光儲存於 25°C 下。

2206-01



溫士頓醫藥股份有限公司
台南市永康區鹽洲里仁愛街117號