



服皮欣[®] 乳膏20毫克/公克

Fuskin Cream 20mg/gm

【成份】

Each gm contains:

Fusidic acid 20mg

【賦形劑】

Cremophor(A6)、Cremophor(A-25)、Vaseline、Cetyl Alcohol、Liquid Paraffin、Glycerine、Cyclomethicone、Butylated Hydroxyanisole、Potassium Sorbate、E.D.T.A. Disodium

【特性】

Fusidic acid是一種具有強效抗菌作用的抗生素，對大部分的革蘭氏陽性菌有效，尤其是葡萄球菌，亦包括對盤尼西林或其他抗生素有抗藥性者。

Fusidic acid除了對各種皮膚感染症有效外，甚至應用於完整無傷口的皮膚，fusidic acid亦具滲透入感染病灶的能力。

【適應症】

葡萄球菌、鏈球菌或其他對fusidic acid敏感的細菌的皮膚感染症。

【用法用量】

本藥須由醫師處方使用。

乳膏適量塗於患部，每日2-3次，一般持續塗7天，亦可依病情延長用藥時間。

【副作用】

耐受性良好，過敏反應極罕見。

【儲存條件】

25°C以下儲存。

【包裝】

100公克以下鋁管裝、塑膠瓶裝、450公克塑膠瓶裝。

瑞士藥廠股份有限公司
SWISS PHARMACEUTICAL CO., LTD.
新市廠:台南市新市區中山路182號