

# "永信" 骨永壯膠囊

## Glustrong Capsules "Yung Shin"

衛署藥製字 第 043262 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2022-05-06

### 1 成分

#### 1.1 有效成分及含量

有效成分及含量：每膠囊中含：Crystalline glucosamine sulphate.....314 mg  
(相當於250mg之glucosamine sulphate)

#### 1.2 其他成分(賦形劑)

Corn Starch、Lactose、Magnesium Stearate、Talc、Capsule #1 (Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Brilliant Blue FCF、New Coccin、Titanium Dioxide、Tartrazine、Sunset Yellow FCF)。

### 2 用途(適應症)

緩解退化性關節炎之疼痛。

### 3 使用上注意事項

#### 3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 曾因本藥成分引起過敏。

#### 3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 嚴重肝腎疾病的人。

#### 3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.1 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

#### 3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。

3.4.2 避免陽光直射。

3.4.3 Glucosamine係Causal therapy其治療效果必須從開始治療之後1星期之後才可看到，所以病情嚴重時，在開始治療第1天可加抗發炎藥物和Glucosamine併服。

3.4.4 本藥應置於小兒伸手不及處。

3.4.5 請在有效期限內使用。

### 4 用法用量

關節炎病症	用法用量
-------	------

輕度至中度	每次2粒，每日2次，連續治療6個星期。
嚴重程度	a.初期治療：每次2粒，每日3次，持續治療至少8個星期，飯前15分鐘服用。 b.繼續治療：每次2粒，每日2次，持續治療3~4個月，飯前15分鐘服用。可依醫師處方服用亦可。

## 5 警語

5.1 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
皮膚	過敏反應，如：紅、腫、癢或起疹子
胃腸	覺得胃不舒服、胃痛、脹氣、便秘、拉肚子、消化不良、噁心、嘔吐

5.2 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.2.1 過敏反應、伴隨搔癢和紅斑的皮膚性出疹。

5.2.2 若有上述外之其他不適情況產生。

5.2.3 自覺狀況沒有改善或更惡化。

## 6 包裝

8~1000粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

## 7 儲存方式

於25°C以下、避光儲存。

## 8 類別

醫師藥師藥劑生指示藥品。

## 製造廠

永信藥品工業股份有限公司台中幼  
獅廠

台中市大甲區日南里工九路27號

## 藥商

永信藥品工業股份有限公司

台中市大甲區頂店里中山路一段1191號