"紐約"痔瘡膏

"NEW YORK" HEMORRHOIDS OINTMENT

內衛藥製字 第 005461 號 醫師藥師藥劑生指示藥品 版本日期 2022-05-19

本藥含有止痛、止癢、活血和殺菌的成分組合而成,可以用於緩解痔瘡所引起的不舒服症狀。

1 成分

1.1 有效成分及含量

Each 100 g contains:

1.2 其他成分(賦形劑)

Bismuth subgallate · Peru balsam · White petrolatum · Mineral oil · Span 60 · Lanolin anhydrous · Propylene glycol

2 用途(適應症)

急、慢性內外痔瘡、混合痔、痔出血、單純性直腸炎、肛門裂傷。

- 3 使用上注意事項
 - 3.1 有下列情形者,請勿使用
 - 3.1.1 曾因本藥成分引起過敏的人。
 - 3.2 有下列情形者,使用前請洽醫師診治
 - 3.2.1 未滿12歲。
 - 3.2.2 排尿困難及曾診斷為青光眼的人。
 - 3.2.3 服用抗憂鬱劑及曾診斷為下列疾病的人:高血壓、心臟病、糖尿病、甲狀腺機能亢進、 因前列腺肥大引起排尿困難。
 - 3.3 有下列情形者,使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生
 - 3.3.1 正在接受醫生治療痔瘡的人。
 - 3.3.2 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
 - 3.3.3 如果使用本藥7天後仍需繼續使用。
 - 3.4 其他使用上注意事項
 - 3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。
 - 3.4.2 避免陽光直射。

- 3.4.3 勿超過建議使用量或使用次數。
- 3.4.4 使用前,請以中性肥皂和溫水清潔患部,並以衛生紙或柔軟毛巾輕拍到乾。
- 3.4.5 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛,請立刻以水或溫水沖洗,並立即前往眼科就醫。
- 3.4.6 本藥限於肛門外部或直腸末端內使用,不得內服。

4 用法用量

一天三次及大便	將盒內附備之注入器緊旋於油膏管口,再插入肛門深處之直腸部位,壓擠油膏管
後使用	下端,使油膏均匀射出,散佈於患部。

5 警語

5.1 使用本藥後,若有發生以下副作用,請立即停止使用,並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
皮膚	起疹、發紅、發癢、腫脹、乾燥感、熱感、刺痛感、發炎、疼痛。
其他	刺激感。

- 5.2 使用本藥後,若有發生以下症狀時,請立即停止使用,並接受醫師診治
 - 5.2.1 若有持續出血情況。
 - 5.2.2 若有上述外之其他不適情況產生。
 - 5.2.3 使用7天後,自覺狀況沒有改善或更惡化。
 - 5.2.4 手腳疲倦、麻痺、緊繃、僵硬、無力、肌肉酸痛、不明瘀青、流鼻血、牙齦出血、臉色 蒼白、疲勞、心悸、氣喘、暈眩、血尿、發燒、發冷等症狀。

6 包裝

1000公克以下鋁軟管裝(附注入器)、瓶裝。

7 類別

醫師藥師藥劑生指示藥品。

8 儲存條件

請於25℃以下保存。

製造廠

人人化學製藥股份有限公司中壢廠 桃園市中壢區南園二路 3 號

藥商

人人化學製藥股份有限公司 桃園市中壢區南園二路 3 號