



"瑞安"愛膚健乳膏10毫克/公克 (艾索那挫)

Isogen Cream 10 mg/g "Purzer" (Isoconazole)

衛署藥製字 第 035870 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2023-01-31

本藥Isoconazole Nitrate用於治療局部黴菌皮膚疾病，為非常廣效之抗黴菌藥。

1 成分

1.1 有效成分及含量

每公克含Isoconazole Nitrate.....10mg

1.2 其他成分(賦形劑)

N, N-Dimethylformamide, Cetyl Alcohol, Stearic Acid, Tefose 63(Propylene Glycol Stearate, Ethylene Glycol Stearate), Propylparaben, Methylparaben, Glycerin, Sodium Hydroxide, Purified Water.

2 用途(適應症)

治療皮膚表淺性黴菌感染，如足癬(香港腳)、體癬、股癬、汗斑。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 曾因本藥成分引起過敏的人。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 三歲以下。

3.2.2 有深部皮膚組織感染。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.1 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

3.3.2 正在接受醫師治療。

3.3.3 患部在臉上。

3.3.4 患部化膿。

3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。

3.4.2 避免陽光直射。

3.4.3 勿超過建議使用量或使用次數。

3.4.4 使用部位或其周圍髒汙時，請洗乾淨後再用藥。

3.4.5 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。

3.4.6 本藥限於外用不得內服，亦不得用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)、濕疹、浸潤、潰爛、龜裂或嚴重外傷的患部。

3.4.7 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。

3.4.8 本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。

3.4.9 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。

3.4.10 一般黴菌感染療程至少為2週，視感染的程度、部位而定。使用本藥須完成全部療程。

4 用法用量

1天1至2次	均勻塗於患部。
--------	---------

5 警語

5.1 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位 副作用

皮膚 局部皮膚刺激及灼熱感、過敏性皮膚炎：如紅、腫、水泡、脫皮、搔癢等。

5.2 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.2.1 若有上述外之其他不適情況產生。

5.2.2 自覺狀況沒有改善或更惡化。

5.2.3 一般黴菌治療7天症狀會改善，股癬和體癬為2週，足癬為4週，如經過前述治療時間，症狀若沒有改善，則應停藥立即就醫。即使症狀改善停藥後，若病情復發亦應立即就醫。

6 包裝

4000公克以下鋁管、鋁塑管、塑膠罐裝。

7 儲存方式

儲存於25°C以下。

8 類別

醫師藥師藥劑生指示藥品。

9 諮詢專線

0800-388-100

112.01.31



製造廠

健康化學製藥股份有限公司

台中市大甲區日南里幼四路 1 2 號

藥商

瑞安大藥廠股份有限公司

台北市內湖區內湖路一段392號11樓之1