善思達持續性藥效肌肉注射懸浮劑100毫克/毫升

INVEGA SUSTENNA®
Prolonged Release Suspension for Intramuscular Injection 100mg/ml

衛署藥輸字第 025394 號

簡語：會升高失智症相關精神病老年病人的死亡率
在使用抗精神病藥物治療的失智症相關精神病老年病人中，死亡的風險有升高的現象。INVEGA SUSTENNA® (paliperidone palmitate)並未被核准用於治療失智症相關精神病人。*【參見臨語和注意事項(5.1)】*

1 適應症與用途

- 治療思覺失調症。
- 分裂情感障礙症之急性治療的單一治療藥物或作為情緒穩定劑及(或)抗憂鬱劑的輔助用藥。

2 劑量與用法

2.1 投藥須知

每次注射都必須由健康照護專業人員施行。
非腸道給予的藥物在給藥之前，均應先以肉眼觀察是否有異物及是否變色。
INVEGA SUSTENNA®僅供肌肉注射使用。切勿透過任何其他途徑給藥。應小心避免不慎注入血管。應一次注射全部劑量。切勿將一劑分成數次施打。應慢慢注入深部三角肌或臀部肌肉。
投予INVEGA SUSTENNA®時僅可使用INVEGA SUSTENNA®包裝中所提供的針頭。
將INVEGA SUSTENNA®注入手臂三角肌時所使用之針頭的建議型號須視病人的體重而定：
- 對體重未逮90公斤的病人，建議使用1吋的23號針頭。
- 對體重逮90公斤(含)以上的病人，建議使用1½吋的22號針頭。
- 進行手臂三角肌注射時應交替使用兩側的手臂三角肌。

將INVEGA SUSTENNA®注入臀部肌肉時，不論病人的體重為何，所使用之針頭的建議型號皆為1½吋的22號針頭。
應注射於上外側四分之一的臀部肌肉。進行臀部肌肉注射時應交替使用兩側的臀部肌肉。

2.2 思覺失調症與分裂情感障礙症

對從未使用過口服用paliperidone或口服用或注射用之risperidone的病人，建議在開始使用INVEGA SUSTENNA®治療之前先確認其對口服用paliperidone或口服用risperidone的耐受性。
INVEGA SUSTENNA®用於治療各項核准適應症時的建議劑量如表1所示。開始使用INVEGA SUSTENNA®時的建議起始療程為治療的第一天投予234毫克(paliperidone 150毫克當量)、再於第八天（即一週後）投予156毫克(paliperidone 100毫克當量)，且兩劑都應注射於手臂三角肌。在投予第二劑起始劑量之後，每月一次的維持劑量可注射於手臂三角肌或臀部肌肉。

表1. 使用INVEGA SUSTENNA®治療思覺失調症或分裂情感障礙症成人病人的建議劑量

適應症	起始劑量 (手臂三角肌)		每月一次的 維持劑量[a] (手臂三角肌或臀部肌肉)	每月一次的 最高劑量
	第1天	第8天		
思覺失調症	234毫克	156毫克	39-234毫克[b]	234毫克
分裂情感障礙症	234毫克	156毫克	78-234毫克[c]	234毫克

[a] 於第一次注射的5週後給藥。
[b] 治療思覺失調症的建議維持劑量為117毫克。在其他現有的劑量規格中(39毫克、78毫克、156毫克及234毫克)，有些病人或可因使用較低或較高的維持劑量而獲益。
[c] 依據使用現有之劑量規格時的耐受性及/或療效來調整劑量。在長期分裂情感障礙症研究中並未針對39毫克的劑量進行研究。

可每月調整一次維持劑量。調整劑量時一定要考慮到INVEGA SUSTENNA®的延長釋出特性【*參見藥床藥理學(12.3)*】，因為調整劑量的完整影響可能要到數月之後才會顯現出來。

2.3 遺漏劑量

避免遺漏劑量
INVEGA SUSTENNA®的第二劑起始劑量建議應於第一劑的一週之後投予。為避免遺漏劑量，可於一週時間點(one-week time point)的前後4天內為病人注射第二劑。同樣地，起始療程之後的第三劑及後續的注射劑量都建議以每月一次的方式給藥。為避免遺漏每月一次的劑量，可於每月一次之時間點的前後7天內為病人注射藥物。

遺漏第二劑起始劑量時的處置方式
如果錯過了INVEGA SUSTENNA®的第二劑的預計施打日期(一星期±4天)，建議根據病人施打第一劑後所經過的時間長度來決定是否重新開始療程。如果遺漏第二劑起始劑量，應依照表2所提供的投藥指示給藥。

表2. 遺漏第二劑起始劑量時的處置方式

遺漏第二劑起始劑量的時間點	投藥指示
距離第一次注射的時間未逮4週	**儘快於手臂三角肌注射第二劑起始劑量(156毫克)。** 1. 建議於第一次注射的5週後(不論第二劑的注射時間為何)於手臂三角肌或臀部肌肉注射第三劑(117毫克)。 2. 然後重新開始每月一次定期注射於手臂三角肌或臀部肌肉。
距離第一次注射的時間達4至7週	**依照下列方式重新開始注射兩劑156毫克的劑量：** 1. 儘快於手臂三角肌注射一劑。 2. 一週後於手臂三角肌再注射一劑。 3. 然後重新開始每月一次定期注射於手臂三角肌或臀部肌肉。
距離第一次注射的時間超過7週	**重新開始投予建議起始劑量(*參見第2.2部，表1*)：** 1. 於第1天在手臂三角肌注射234毫克。 2. 於1週後在手臂三角肌注射156毫克。 3. 然後重新開始每月一次定期注射於手臂三角肌或臀部肌肉。

遺漏維持劑量時的處置方式如果遺漏維持劑量，應依照表3所提供的投藥指示給藥。

表3. 遺漏維持劑量時的處置方式

遺漏維持劑量的時間點	投藥指示
距離上次注射的時間達4至6週	**儘快以病人先前所使用的穩定劑量重新開始每月一次的定期注射，然後每隔一個月注射一次。**
距離上次注射的時間達6週至6個月	**依照下列方式重新開始使用病人先前所使用的穩定劑量(但若病人先前所使用的穩定劑量為234毫克，則最初兩次注射的劑量應為156毫克)：** 1. 儘快於手臂三角肌注射一劑。 2. 一週後於手臂三角肌再注射一劑(相同的劑量)。 3. 在第二次注射的一個月之後，重新開始於手臂三角肌或臀部肌肉注射先前所使用的穩定劑量。
距離上次注射的時間超過6個月	**重新開始投予建議起始劑量(*參見第2.2部，表1*)：** 1. 於第1天在手臂三角肌注射234毫克。 2. 於1週後在手臂三角肌注射156毫克。 3. 在第二次注射的一個月之後，重新開始於手臂三角肌或臀部肌肉注射先前所使用的穩定劑量。

2.4 與口服用的Paliperidone併用或與Risperidone併用

由於paliperidone是risperidone的主要活性代謝物，因此，當INVEGA SUSTENNA®與risperidone或口服用之paliperidone長期併用時，應特別謹慎。INVEGA SUSTENNA®與其他抗精神病藥物併用的安全性資料仍極少。

2.5 特殊族群的劑量

腎功能缺損
目前尚未曾系統性地進行過腎臟功能缺損病人使用INVEGA SUSTENNA®的研究【參見臨床藥理學(12.3)】。對輕度腎功能缺損(肌酸酐廓清率≥50毫升/分鐘至<80毫升/分鐘【Cockcroft-Gault公式】)的病人，INVEGA SUSTENNA®的建議起始療程為於第1天投予156毫克，並於一週後投予117毫克，且兩劑皆應注射於手臂三角肌。之後則每月一次於三角肌或臀部肌肉注射78毫克【參見特殊族群之使用(8.6)及臨床藥理學(12.3)】。
INVEGA SUSTENNA®並不建議用於中度或重度腎功能缺損(肌酸酐廓清率<50毫升/分鐘)的病人【*參見特殊族群之使用(8.6)及臨床藥理學(12.3)*】。
與強效的CYP3A4/P-醣蛋白(P-gp)誘導劑合併使用
在INVEGA SUSTENNA®的1個月投藥間隔期間，應盡可能避免使用強效的CYP3A4及/或P-gp誘導劑(如：carbamazepine、rifampin、St John's Wort)。如果必須投予強效的誘導劑，應考慮使用paliperidone持續性藥效肌注劑(PP1M)【*參見藥物交互作用(7.1)及臨床藥理學(12.3)*】。

2.6 自其它抗精神病藥物轉為使用本產品

*目前並無任何系統性療效數的資料可共體質適務思覺失調症或分裂情感障礙症病人從其它抗精神病藥物轉為使用*INVEGA SUSTENNA®治療的結果，也沒有與其它抗精神病藥物併用方面的資料。

自口服抗精神病藥物轉為使用本產品

對從未使用過口服用paliperidone或口服用或注射用之risperidone的病人，建議在開始使用INVEGA SUSTENNA®治療之前先確認其對口服用paliperidone或口服用risperidone的耐受性。
先前所使用的口服抗精神病藥物於開始使用INVEGA SUSTENNA®治療時可以逐漸停用。INVEGA SUSTENNA®的建議劑量為治療開始的第一天投予234毫克，一周後再給予156毫克，均注射於手臂三角肌【*參見劑量與用法(2.2)*】。原先使用不同劑量之INVEGA®持續性藥效緩釋型治療的病人，在使用表4所述的INVEGA SUSTENNA®每月劑量進行維持治療期間可達到相似的paliperidone穩定狀態曝藥量。

janssen

善思達持續性藥效肌肉注射懸浮劑100毫克/毫升

INVEGA SUSTENNA®
Prolonged Release Suspension for Intramuscular Injection 100mg/ml

衛署藥輸字第 025394 號

表4. 達到相似之paliperidone穩定狀態曝藥量所需要的INVEGA®與INVEGA SUSTENNA®的劑量

劑型	INVEGA® 持續性藥效錠	INVEGA SUSTENNA® 注射劑
投藥頻率	每天一次	每4週一次
劑量(毫克)	12	234
	9	156
	6	117
	3	39-78

自長效型注射用抗精神病藥物轉為使用本產品

對從未使用過口服用paliperidone或口服用或注射用之risperidone的病人，建議在開始使用INVEGA SUSTENNA®治療之前先確認其對口服用paliperidone或口服用risperidone的耐受性。
要為原先使用長效型注射用抗精神病藥物的病人轉換治療藥物時，可於下一個給定的注射時間開始改用INVEGA SUSTENNA®治療。然後應以每隔一個月注射一次的方式繼續使用INVEGA SUSTENNA®，並不須進行第2.2節中所描述的一週起始療程。關於建議的每月一次維持劑量，請參見上文的表1。根據先前的耐受性及/或療效方面的臨床表現，在現有的劑量規格中(39毫克、78毫克、117毫克、156毫克及234毫克)，有些病人或可因使用較低或較高的維持劑量而獲益。在長期分裂情感障礙症研究中並未針對39毫克的劑量進行研究。每月一次的維持劑量可注射於手臂三角肌或臀部肌肉【*參見劑量與用法(2.2)*】。
停用INVEGA SUSTENNA®時，一定要考慮到其延長釋出特性。一如其它抗精神病藥物的使用建議，應定期重新評估願意使用藥體外線性(EPS)治療藥物的必要性。

2.7 使用指示

每次注射都必須由健康照護專業人員施行。
包裝中裝有一支預充針筒及2支供肌肉注射用的安全針頭(一支1½吋的22號針頭及一支1吋的23號針頭)。



INVEGA SUSTENNA®僅供單次使用。

a. 用力震搖針筒至少10秒鐘，以確保形成均勻的懸浮液。

b. 選擇適當的針頭。
進行三角肌注射時：
- 如果病人的體重未逮90公斤，請使用1吋的23號針頭(藍色針座的針頭)。
- 如果病人的體重逮90公斤(含)以上，請使用1½吋的22號針頭(灰色針座的針頭)。

進行臀部肌肉注射時：
不論病人的體重為何，請使用1½吋的22號針頭(灰色針座的針頭)。

c. 垂直握住針筒，以頂蛙線方向旋轉的方式移除橡膠頂蓋。



d. 將安全針頭的包裝撕開一半。邊邊塑殼包裝抓住針頭套。以頂蛙線方向旋轉的方式將安全針頭安裝到針筒的接頭(luer connection)上。



e. 以垂直向上拉的方式將針頭套自針頭上拉開。切勿扭轉針頭套，否則針頭可能會從針筒上鬆開。



f. 垂直握住裝有針頭的針筒，以使排除空氣。小心向前推動推桿，排除針筒中的空氣。



g. 以肌肉注射的方式將全部內容物緩慢、深入地注入病人的三角肌位置或臀部肌肉。**切勿透過任何其他途徑投藥。**

h. 注射完成後，利用一手的拇指及食指(h1、h2)或平坦的表面(h3)來啟動針頭保護系統。當聽到「卡喀」的聲音時，即表示針頭保護系統已完全產生作用。請以適當的方式起套針筒與針頭。



3. 劑型與劑量規格

INVEGA SUSTENNA®為白色至灰白色的水溶性持續性藥效肌肉注射用懸浮液，其劑量規格包括內含39毫克、78毫克、117毫克、156毫克與234毫克paliperidone palmitate的單劑量預充填針筒注射劑。

4. 禁忌

INVEGA SUSTENNA®禁用於已知對paliperidone或risperidone過敏，或是對INVEGA SUSTENNA®配方中之任一賦形劑過敏的病人。曾經在使用risperidone及paliperidone治療的病人被通報發生過敏反應的病例，包括嚴重過敏反應與血管性水腫。Paliperidone palmitate會轉化成paliperidone，而paliperidone也是risperidone的代謝物之一。

5 警語和注意事項

5.1 會升高失智症相關精神病老年病人的死亡率
在使用抗精神病藥物治療的失智症相關精神病老年病人中，死亡的風險有升高的現象。針對17項安慰劑對照試驗(為期10週)，其中大部分的病人都使用非典型抗精神病藥物，進行分析的結果顯示，藥物治療組中的死亡風險為安慰劑組的1.6至1.7倍。在一項典型的10週對照試驗期間中，藥物治療組的死亡率約為4.5%，而安慰劑組則約為2.6%。雖然致死原因非常多，但大部分的死亡病例顯示可歸因於心血管病變(如心臟衰竭、猝死)或感染(如肺炎)。觀察性試驗顯示，與使用非典型抗精神病藥物治療相同，使用傳統抗精神病藥物治療也可能會升高死亡率。目前還不清楚這些觀察性試驗中的死亡率升高現象可能歸因於抗精神病藥物抑或某些病人特質的存在。INVEGA SUSTENNA®並未核核准用於治療失智症相關精神病【*參見加框警語及警語和注意事項(5.2)*】。

5.2 發生於失智症相關精神病老年病人的腦血管不良事件，包括中風
在使用risperidone、aripiprazole與olanzapine治療患有失智症之老年受試者的安慰劑對照試驗中，用藥組腦血管不良事件(腦血管意外與暫時性腦缺血發作，包括死亡病例)的發生率要高於使用安慰劑治療的受試者。目前尚未進行過任何對老年失智症病人使用口服用paliperidone、INVEGA SUSTENNA®與3個月paliperidone palmitate持續性藥效注射懸浮劑的研究。這些藥物也尚未核准用於治療失智症相關精神疾病的人【*參見加框警語及警語和注意事項(5.1)*】。

5.3 抗精神病藥物惡性症候群(Neuroleptic Malignant Syndrome)
抗精神病藥物惡性症候群(NMS)－一種可能致命之複合症狀，曾有通報發生在伴隨使用抗精神病藥物(包括paliperidone)期間。
NMS的臨床表現包括高燒、肌肉僵硬、心智狀態改變包含譫妄、以及自律神經失調(脈搏或血壓失調、心跳過速、發汗與心律不整)。其它的徵兆可能包括肌酸磷酸激酶升高、肌球蛋白尿(橫紋肌溶解症)與急性腎衰竭。
如果懷疑發生NMS，應立即停用INVEGA SUSTENNA®並提供系統性的療法和監測。

5.4 QT間期延長
Paliperidone會使校正後QT (QTc)間期略為延長。應避免將paliperidone與其它已知會延長QTc的藥物併用，包括第1A類(如quinidine、procainamide)或第III類(如aminodarone、sotalol)的抗心律不整藥物、抗精神病藥物(如chlorpromazine、thioridazine)、抗生素(如gatifloxacin、moxifloxacin)、或是任何其它類已知會延長QTc間期的藥物。Paliperidone亦應避免用於併有先天性長QT間期症候群的病人、以及有心律不整病史的病人。
有些狀況可能會升高在使用會延長QTc間期之藥物時發生尖端扭轉型心室心搏過速(torsade de pointes)及(或)猝死的風險，這些狀況包括(1)心搏徐緩；(2)低血鉀或低血鎂；(3)併用其它會延長QTc間期的藥物；以及(4)有先天性的QT間期延長現象。
在一項針對思覺失調症與分裂情感障礙症成人病人所進行的雙盲、活性藥物對照性(單劑moxifloxacin 400毫克)多中心QT研究，以及三項針對思覺失調症成人病人所進行的安慰劑與活性藥物對照性6週固定劑量療效試驗，曾評估過口服paliperidone對QT間期的影響。
在QT研究中(n=141)，於第8天投藥1.5小時後進行檢測的結果顯示，8毫克立即釋出型口服用paliperidone治療組(n=50)減去安慰劑組的QTcLD平均較基礎期增加了12.3毫秒(90% CI：8.9；15.6)。這種8毫克劑量之立即釋出型paliperidone的平均穩定狀態尖峰血中濃度($C_{max\ ss}$ = 113 ng/mL)要比在三角肌注射最大建議劑量234毫克之INVEGA SUSTENNA®所達到的曝藥量(預測中位$C_{max\ ss}$ = 50 ng/mL)高出兩倍以上。在同一項研究中，於第二天投藥1.5小時後進行檢測的結果顯示，4毫克立即釋出型口服用paliperidone治療組($C_{max\ ss}$ = 35 ng/mL)減去安慰劑組的QTcLD增加了6.8毫秒(90% CI：3.6；10.1)。
在三項使用口服用paliperidone延長釋出劑型治療思覺失調症病人的固定劑量療效研究中，於不同時點進行心電圖(ECG)檢查的結果顯示，只有一位口服用paliperidone 12毫克治療組的受試者在第6天的一個時間點中出現超過60毫秒的變化(增加62毫秒)。
在四項針對使用INVEGA SUSTENNA®治療思覺失調症病人所進行的固定劑量療效研究及針對分裂情感障礙症病人所進行的長期研究中，所有時間點都沒有任何受試者出現QTcLD變化超過60毫秒的現象，也沒有任何受試者的QTcLD值>500毫秒。在針對思覺失調症病人所進行的雙時治療研究中，並無任何受試者的QTcLD變化>60毫秒，且只有一位受試者的QTcLD值達到507毫秒(Bazett氏QT修正期間【QTcB】值為483毫秒)；後面這位受試者的心跳速率為每分鐘45次。

5.5 遲發性運動異常(Tardive Dyskinesia)
遲發性運動異常是一種結合了潛在不可逆、不自主異常運動現象，可能會發生在使用抗精神病藥物治療的病人。雖然這種症候群似乎在老年人當中的盛行率最高，尤其是老年女性，但並無法預測哪些病人會發生這種症候群。目前並不確知各種抗精神病藥物引發遲發性運動異常的可能性是否各不相同。
發生遲發性運動異常的風險及其嚴成不可逆症狀的可能性，似乎會隨著治療之持續時間及累積劑量而升高。此症候群也可能在治療相對較短的時間之後發生，即使是使用低劑量。此症狀在停止治療後也可能發生。
遲發性運動異常在停用抗精神病藥物之後或可部份緩解或完全緩解。然而抗精神病治療本身便可能會壓制(或部份壓制)這種症候群的徵兆或症狀，因此可能會遮蔽潛在的病程。目前並不確知症狀壓制作用對此症候群之長期病程的影響。
鑒於這些考量，處方INVEGA SUSTENNA®時應採取最可能避免發生遲發性運動異常的用藥方式。一般而言，長期使用抗精神病藥物治療的方式應保留給：(1)罹患已知可對抗精神病藥物產生反應之慢性疾病的病人以及(2)無法獲得可用或適當替代且療效相等但潛在危害較少之治療方式的病人。對確實需要長期治療的病人，應採用可達到令人滿意之臨床療效反應的最低劑量及最短療程。應定期再次評估繼續治療的必要性。
使用INVEGA SUSTENNA®的病人如果出現遲發性運動異常的徵兆或症狀，應考慮停藥。不過，有些出現此症候群的病人可能仍須使用INVEGA SUSTENNA®治療。

5.6 代謝改變
使用非典型抗精神病用藥會與代謝改變有關，可能會增加心血管/腦血管風險。這些代謝改變包含高血糖、血脂異常與體重增加。這類藥物均會產生一些代謝改變，而每一種藥都有其特殊的風險特質。

高血糖與糖尿病
在使用各種非典型抗精神病藥物治療的病人中都曾有發生高血糖或糖尿病的報告，有些病例的血糖升高幅度極大，並且伴有酮酸血症或高滲透壓性昏迷，或是因而死亡。這些病例大部份都是見於上市後的臨床使用期間與流行病學研究，而非臨床試驗。在使用INVEGA SUSTENNA®治療的試驗受試者中曾有發生高血糖及糖尿病的報告。使用非典型抗精神病藥物與發生血糖異常風險會關聯性的評估相當複雜，因為思覺失調症病人發生糖尿病的背景風險可能本來就較高，而一般人口中的糖尿病發生率也在不斷升高當中。由於有這些干擾因素，目前仍無法完全了解使用非典型抗精神病藥物與發生高血糖相關不良事件之間的關聯性。不過，流行病學研究指出，在使用非典型抗精神病藥物治療的病人中，於治療期間出現高血糖相關不良反應的風險有升高的現象。
對經診斷確定患有糖尿病並開始使用非典型抗精神病藥物治療的病人，應定期監測是否出現血糖控制惡化的現象。對有糖尿病危險因子(例肥胖、糖尿病家族史)並準備開始使用非典型抗精神病藥物治療時的病人，應於開始治療時進行空腹血糖檢測，並於治療期間定期檢測。任何使用非典型抗精神病藥物治療的病人都應監視是否出現高血糖的症狀，包括劇渴、多尿、多吃、以及身體虛弱。對在使用非典型抗精神病藥物治療期間發生高血糖症狀的病人，應進行空腹血糖檢測。在某些病例中，高血糖的現象在停用非典型抗精神病藥物之後便會消退；不過，有些病人即使停用可疑藥物仍須繼續接受抗糖尿病治療。
在4個安慰劑組控制(一個9週，三個13週)，以固定劑量治療思覺失調症病人的試驗中，所得到的整合資料顯示於表5中。

表5. 4個安慰劑組控制，9週至13週，以固定劑量治療思覺失調症病人的試驗中，受試者的空腹血糖變化

	安慰劑組	INVEGA SUSTENNA®					
		39毫克	78毫克	156毫克	234/39毫克[a]	234/156毫克[a]	234/234毫克[a]
		依據基準的平均改變(mg/dL)					
依據基準的血糖變化	n=367	n=86	n=244	n=238	n=110	n=126	n=115
	-1.3	1.3	3.5	0.1	3.4	1.8	-0.2
	血糖改變的病人比例						
血糖從正常值變成偏高(從<100 mg/dL至≥126 mg/dL)	4.6% (11/241)	6.3% (4/64)	6.4% (11/173)	3.9% (6/154)	2.5% (2/79)	7.0% (6/86)	6.6% (5/76)

[a] 起始劑量234毫克注射在手臂三角肌後，隨後每隔四週在手臂三角肌或臀部肌肉注射39毫克、156毫克或234毫克。 試驗中其他組別(39毫克、78毫克和156毫克)僅在臀部肌肉注射 *【參見臨床研究(14.4)】*。

在一個針對思覺失調症病人所進行的長期，開放式，藥物動力及安全性試驗中，最高劑量(234毫克)曾經被評估，INVEGA SUSTENNA®與血糖平均改變的關聯在第29週(n=109)時為-0.4 mg/dL，第53週(n=100)時為+6.8 mg/dL。
在一項針對分裂情感障礙症病人所進行之長期研究的最初25週開放階段中，INVEGA SUSTENNA®所引起的血糖平均變化為+5.3 mg/dL(n=518)。在這項研究的後續15個月雙盲階段達到終點時，INVEGA SUSTENNA®組所引起的血糖平均變化為+0.3 mg/dL (n=131)，而安慰劑組的平均變化則為+4.0 mg/dL (n=120)。
血脂異常
曾在使用非典型抗精神病藥物期間觀察到不良的血脂變化。
在4個安慰劑組控制(一個9週，三個13週)，以固定劑量治療思覺失調症病人的試驗中，所得到的整合資料顯示於表6中。

表6. 4個安慰劑組控制，9週至13週，以固定劑量治療思覺失調症病人的試驗中，受試者的空腹血脂變化

	安慰劑組	INVEGA SUSTENNA®					
		39毫克	78毫克	156毫克	234/39毫克[a]	234/156毫克[a]	234/234毫克[a]
		依據基準的平均改變(mg/dL)					
依據基準的膽固醇變化	n=366	n=89	n=244	n=232	n=105	n=119	n=120
	-6.6	-6.4	-5.8	-7.1	-0.9	-4.2	9.4
依據基準的LDL變化	n=275	n=80	n=164	n=141	n=104	n=117	n=108
	-6.0	-4.8	-5.6	-4.8	0.9	-2.4	5.2
依據基準的HDL變化	n=286	n=89	n=165	n=150	n=105	n=118	n=115
	0.7	2.1	0.6	0.3	1.5	1.1	0.0
依據基準的三酸甘油酯變化	n=366	n=89	n=244	n=232	n=105	n=119	n=120
	-16.7	7.6	-9.0	-11.5	-14.1	-20.0	11.9
	血脂改變的病人比例						
膽固醇從正常值變成偏高(從<200 mg/dL至≥240 mg/dL)	3.2% (7/222)	2.0% (1/51)	2.0% (3/147)	2.1% (3/141)	0% (0/69)	3.1% (2/65)	7.1% (6/84)
LDL從正常值變成偏高(從<100 mg/dL至≥160 mg/dL)	1.1% (1/95)	0% (0/29)	0% (0/67)	0% (0/46)	0% (0/41)	0% (0/37)	0% (0/44)
HDL從正常值變成偏低(從≥40 mg/dL至<40 mg/dL)	13.8% (28/203)	14.8% (9/61)	9.6% (11/115)	14.2% (15/106)	12.7% (9/71)	10.5% (8/76)	16.0% (13/81)
三酸甘油酯從正常值變成偏高(從<150 mg/dL至≥200 mg/dL)	3.6% (8/221)	6.1% (3/49)	9.2% (14/153)	7.2% (10/139)	1.3% (1/79)	3.7% (3/82)	10.7% (9/84)

[a] 起始劑量234毫克注射在手臂三角肌後，隨後每隔四週在手臂三角肌或臀部肌肉注射39毫克、156毫克或234毫克。 試驗中其他組別(39毫克、78毫克和156毫克)僅在臀部肌肉注射 *【參見臨床研究(14.1)】*。

在一個針對思覺失調症病人所進行之長期開放性擴點及安全性試驗中，最高劑量(234毫克)曾經被評估，血脂值相較於基礎值的平均變化如表7所示。

表7. 針對思覺失調症病人所進行之長期開放性擴點藥物動力學安全性研究中的空腹血脂變化

	INVEGA SUSTENNA® 234毫克	
	第29週	第53週
	依據基準的平均改變(mg/dL)	
依據基準的膽固醇變化	n=112 -1.2	n=100 0.1
依據基準的LDL變化	n=107 -2.7	n=89 -2.3
依據基準的HDL變化	n=112 -0.8	n=98 -2.6
依據基準的三酸甘油酯變化	n=112 16.2	n=100 37.4

在一項針對分裂情感障礙症病人所進行的長期研究中，最初25週開放治療階段及後續15個月雙盲治療階段達到終點時的血脂值相較於基礎值的平均變化如表8所示。

表8. 一項針對分裂情感障礙症病人所進行之長期研究的開放雙盲階段中的空腹血脂變化

	開放階段	雙盲階段	
	INVEGA SUSTENNA®	安慰劑	INVEGA SUSTENNA®
		依據基準的平均改變(mg/dL)	
依據基準的膽固醇變化	n=198 -3.9	n=119 -4.2	n=132 2.3
依據基準的LDL變化	n=198 -2.7	n=117 -2.8	n=130 5.9
依據基準的HDL變化	n=198 -2.7	n=119 -0.9	n=131 -0.7
依據基準的三酸甘油酯變化	n=198 7.0	n=119 2.5	n=132 -12.3

體重增加
曾在使用非典型抗精神病藥物期間觀察到體重增加的現象。建議臨床上監測體重。
在4個安慰劑組控制(一個9週，三個13週)，以固定劑量治療思覺失調症病人的試驗中，所得到的平均體重變化以及體重增加≥7%之比例顯示於表9中。

表9. 4個安慰劑組控制，9週至13週，以固定劑量治療思覺失調症病人的試驗中，受試者的平均體重變化以及體重增加≥7%之比例

	INVEGA SUSTENNA®						
	安慰劑組	39毫克	78毫克	156毫克	234/39毫克[a]	234/156毫克[a]	234/234毫克[a]
	n=451	n=116	n=280	n=267	n=137	n=144	n=145
依據基準的體重變化量(kg)	-0.4	0.4	0.8	1.4	0.4	0.7	1.4
體重增加≥7%之比例	3.3%	6.0%	8.9%	9.0%	5.8%	8.3%	13.1%

[a] 起始劑量234毫克注射在手臂三角肌後，隨後每隔四週在手臂三角肌或臀部肌肉注射39毫克、 156毫克或234毫克。 試驗中其他組別(39毫克、 78毫克和156毫克)僅在臀部肌肉注射 *【參見臨床研究(14.1)】*。

在一個長期，開放式，藥物動力及安全性試驗中，最高劑量(234毫克)曾經被評估，INVEGA SUSTENNA®與平均體重變化的關聯在第29週(n=134)時為+2.4 kg以及在第53週(n=113)時為+4.3 kg。
在一項針對分裂情感障礙症病人所進行之長期研究的最初25週開放階段中，INVEGA SUSTENNA®所引起的體重平均變化為+2.2公斤，並有18.4%之受試者的體重增加幅度≥7% (n=653)。在這項研究的後續15個月雙盲階段達到終點時，INVEGA SUSTENNA®所引起的體重平均變化為-0.2公斤，並有13.0%之受試者的體重增加幅度≥7% (n=161)；安慰劑組中的體重平均變化為-0.8公斤，並有6.0%之受試者的體重增加幅度≥7% (n=168)。

5.7 直立性低血壓與暈厥
由於paliperidone具有α-腎上腺素阻斷作用，因此可能會使某些病人發生直立性低血壓及暈厥的反應。在四項固定劑量、雙盲、安慰劑對照試驗中，使用INVEGA SUSTENNA® (在39毫克至234毫克的建議劑量範圍內)治療的受試者通報發生暈厥反應的比例為<1% (4/1293)，在使用安慰劑治療的病人中則為0% (0/510)。在這四項針對思覺失調症病人所進行的固定劑量療效研究中，使用INVEGA SUSTENNA®治療的受試者通報發生直立性低血壓不良事件的比例為<1% (2/1293)；而安慰劑組則為0% (0/510)。在針對思覺失調症與分裂情感障礙症病人所進行的長期研究中，直立性低血壓與暈厥反應的發生率和短期研究中的觀察結果大致相當。
對已知患有心血管疾病(如心臟衰竭、心肌梗塞或局部缺血之病史、傳導異常)、腦血管疾病、或處於容易發生低血壓反應之狀況(如脫水、低血容、以及使用抗高血壓藥物治療)的病人，使用INVEGA SUSTENNA®時應謹慎。對容易發生低血壓的病人，應考慮監視身體直立時的生命徵象。

5.8 跌倒
使用抗精神病藥物(包含INVEGA SUSTENNA®)曾發生嗜睡、姿勢性低血壓、運動及感覺失調的報告，此類藥物可能會導致跌倒及因此骨折或其他跌倒相關的傷害。對於患有疾病、健康狀況或使用的藥物可能會加劇這些影響的病人(尤其是年長者)，於開始抗精神病藥物治療時應評估跌倒的風險，長期接受抗精神病藥物治療的病人也應定期重複評估。

5.9 白血球減少症、嗜中性白血球減少症、以及顆粒性白血球缺乏症
在臨床試驗及/或上市後的使用經驗中，曾有發生與抗精神病藥物(包括INVEGA SUSTENNA®)短暫相關的白血球減少症及嗜中性白血球減少症的報告。亦曾有發生顆粒性白血球缺乏症的報告。
白血球減少症/嗜中性白血球減少症的可能危險因子包括原先即有白血球計數(WBC)/絕對嗜中性白血球計數(ANC)偏低的現象，以及藥物誘發性白血球減少症/嗜中性白血球減少症的病史。對曾出現臨床上明顯之WBC/ANC偏低現象或有藥物誘發性白血球減少症/嗜中性白血球減少症之病史的病人，在開始治療的最初幾個月期間密切檢查全血球計數是很重要的。如果在沒有其它原因的情況下出現第一個臨床上明顯的WBC下降徵兆時，即應考慮停用INVEGA SUSTENNA®，並追蹤其WBC直到恢復正常為止。
對發生臨床上明顯之嗜中性白血球減少症的病人，應監視是否出現發燒現象或其它意味發生感染的症狀或徵兆，如果發生這些症狀或徵兆，應立即給予治療。對發生嚴重嗜中性白血球減少症(絕對嗜中性白血球計數<1000/mm³)的病人，應停止使用INVEGA SUSTENNA®，並追蹤其WBC，直到恢復正常為止。

5.10 高泌乳激素血症
和其它會拮抗多巴胺D₂受體的藥物一樣，paliperidone也會升高泌乳激素的濃度，且這種濃度升高的現象在長期投藥期間會持續存在。Paliperidone的泌乳激素升高作用和risperidone類似，而使用risperidone時的泌乳激素濃度升高幅度要比其它的抗精神病藥物高。
不論病因為何，高泌乳激素血症都可能會抑制下視丘GnRH，從而導致腦下垂體促性腺激素(gonadotrophin)分泌降低。這會減弱女性和男性病人的性腺類固醇生成作用，並可能因而抑制其生殖功能。在使用會升高泌乳激素之藥物的病人中，曾有發生泌乳、月經、男性女乳症及隔膜的報告。長期存在的高泌乳激素血症在伴有性腺功能減退問題的情況下，可能會使男性和女性病人出現骨質密度降低的現象。
體外組織培養實驗顯示，約有1/3的人類乳癌和泌乳激素有關，當準備對先前曾給出乳癌的病人處方這些藥物時，這是一個可能相當重要的考量因素。在針對小鼠和大鼠所進行的risperidone致癌性研究中發現，腦下垂體瘤、乳腺瘤與腺島細胞瘤的發生率有升高的現象(乳腺腺癌、腦下垂體腫瘤與胰臟腺瘤)【*參見非臨床毒理學(13.1)*】。至今所進行的臨床研究與流行病學研究皆未顯示對人類長期投予此類藥物與發生腫瘤之間存有關聯性，但由於現有的資料太少，因此並無法做出定論。
從兩項用INVEGA SUSTENNA®進行之長期、雙盲、安慰劑對照研究所獲得的泌乳激素相關資料如下文的說明；其中一項是針對思覺失調症病人所進行的研究；另一項是針對分裂情感障礙症

表11. 依各評估量表之發生率及使用抗躁鬱激性藥物治療之精形進行評估的鐘體外症狀(EPS)-成人思覺失調症研究

量表	受試者比例			
	安慰劑 (N=262)	INVEGA SUSTENNA® 39毫克 (N=130)	78毫克 (N=223)	156毫克 (N=228)
帕金森氏症[a]	9	12	10	6
靜坐不能[b]	5	5	6	5
異動症[c]	3	4	6	4
使用抗躁鬱激性藥物[d]	12	10	12	11

[a] 帕金森氏症的發生率係指遵試驗終點時，Simpson-Angus總分>0.3的受試者比例(總分的定義為各評估項目之評分總和除以評估項目數目的結果)
[b] 靜坐不能的發生率係指遵試驗終點時，Barnes靜坐不能量表總分≥2的受試者比例
[c] 異動症的發生率係指遵試驗終點時，在異常不自主運動量表的前7個評估項目中有任一項目的評分≥3，或在前7個評估項目中有任兩個(含)以上之項目的評分≥2的病人比例
[d] 接受抗躁鬱激性藥物治療突發之EPS的受試者比例

表12. 鐘體外症狀(EPS)相關事件，依MedDRA的代表術語分列-成人思覺失調症研究

EPS類別	受試者比例			
	安慰劑 (N=262)	INVEGA SUSTENNA® 39毫克 (N=130)	78毫克 (N=223)	156毫克 (N=228)
發生EPS相關不良事件的整體受試者比例	10	12	11	11
帕金森症候	5	6	6	4
運動機能亢進	2	2	2	4
顫抖	3	2	2	3
異動症	1	2	3	1
肌張力不全	0	1	1	2

帕金森症候群的事件包括：鐘體外疾患、肌張力亢進、肌肉骨骼僵硬、帕金森氏症、流口水、面具臉、肌肉緊繃、運動機能減退
運動機能亢進類的事件包括：靜坐不能、腳部躁動症候群、坐立不安
異動症類的事件包括：異動症、舞蹈徐動症、肌肉抽動、肌躍症、遲發性運動異常
肌張力不全類的事件包括：肌張力不全、肌肉痙攣

在針對思覺失調症病人所進行之維持治療試驗的各個階段中，所獲得的結果都有類似的發現。在9週、固定劑量、雙盲、安慰劑對照試驗的INVEGA SUSTENNA® 156毫克治療組中，發生帕金森氏症與靜坐不能的病人比例(分別為18%與11%)要高於INVEGA SUSTENNA® 78毫克治療組(分別為9%與5%)與安慰劑組(分別為7%與4%)。上述發生率乃依評估量表進行評估而得。

在針對思覺失調症病人所進行的以234毫克做為起始劑量的13週研究中，雖然在何EPS的發生率和安慰劑組(8%)大致相當，但也呈現出和劑量相關的模式，在INVEGA SUSTENNA® 234/39毫克、234/156毫克與234/234毫克治療組中分別為6%、10%與11%。在這項研究中，運動機能亢進是最為常見的EPS相關不良事件類別，安慰劑組(4.9%)與INVEGA SUSTENNA® 234/156毫克(4.8%)及234/234毫克(5.5%)治療組中的發生率大致相當，但在234/39毫克治療組中的發生率(1.3%)則較低。

在針對分裂情感障礙症病人所進行的長期研究中，於25週INVEGA SUSTENNA®開放治療階段所通報的EPS包括運動機能亢進(12.3%)、帕金森氏症(8.7%)、顫抖(3.4%)、異動症(2.5%)、以及肌張力不全(2.1%)。在15個月雙盲治療期間，任何EPS的發生率和安慰劑組大致相當(分別為8.5%和7.1%)。在這項研究之雙盲階段的任一治療組中(INVEGA SUSTENNA®組與安慰劑組)，最常通報的於治療期間出現的EPS相關不良事件(>2%)為運動機能亢進(3.7% vs. 2.9%)、帕金森氏症(3.0% vs. 1.8%)、以及顫抖(1.2% vs. 2.4%)。

肌張力不全

在開始治療的最初幾天期間，較敏感的病人可能會發生肌張力不全的症狀，亦即出現持續較長時間的肌肉群異常收縮現象。肌張力不全的症狀包括：頭部肌肉痙攣，有時會進一步出現喉嚨緊縮、吞嚥困難、呼吸困難及(或)舌頭突出的現象。雖然這些症狀也可能在使用低劑量時發生，但在使用強效及較高劑量的第一代抗精神病藥物時，發生頻率通常比較高，且較為嚴重。在男性和較年輕的族群中，發生急性肌張力不全的風險有升高的現象。

疼痛評估與局部注射部位反應

根據兩項針對思覺失調症病人所進行的13週、固定劑量、雙盲、安慰劑對照性試驗的整合數據，在所有的治療組中，受試者利用一種視覺類比量表(0=無任何疼痛感覺，100=無法忍受的疼痛)自第一次注射至最後一次注射所通報之注射疼痛反應的平均程度都有降低的現象(安慰劑：由10.9降至9.8；39毫克：由10.3降至7.7；78毫克：由10.0降至9.2；156毫克：由11.1降至8.8)。在9週、固定劑量、雙盲、安慰劑對照試驗及維持治療試驗的雙盲階段中，所獲得的結果都有類似的發現。

在針對思覺失調症病人所進行以234毫克做為起始劑量的13週研究中，由首性狀態之研究人員進行評估的結果顯示，硬塊、發紅或腫脹等反應都不常發生，通常為輕度反應、會隨時間而消退，且在INVEGA SUSTENNA®組和安慰劑組中的發生率大致相當。由研究人員評估的注射疼痛反應方面，安慰劑組與INVEGA SUSTENNA®組的結果大致相同。

在研究人員於第一次注射後針對發紅、腫脹、硬塊及疼痛反應所進行的評估中，INVEGA SUSTENNA®組與安慰劑組都有69-100%的受試者被評定為無此類反應。在第92天時，INVEGA SUSTENNA®組與安慰劑組都有95-100%的受試者被研究人員評定為無發紅、腫脹、硬塊及疼痛反應。

使用口服用Paliperidone者於臨床試驗中所通報的其它不良反應

下列為使用口服用paliperidone者於臨床試驗中曾通報的其它不良反應：

心臟疾患：左束支傳導阻滯、竇性心律不整

胃腸道疾患：腹痛、小腸阻塞

全身性疾患與投藥部位症狀：水腫、周邊水腫

免疫系統疾患：嚴重過敏性反應

感染與寄生蟲感染：鼻炎

肌肉骨骼與結締組織疾患：肌肉骨骼痛、斜頸、牙關緊閉

神經系統疾患：大發作痙攣、帕金森氏症步態、暫時性缺血

精神系統疾患：睡眠疾患

生殖系統及乳房疾患：乳房腫脹

呼吸、胸腔及縱膈腔疾患：咽喉痛、吸入性肺炎

皮膚及皮下組織疾患：丘疹

血管疾患：低血壓、局部缺血

6.2 上市後使用經驗

以下是在paliperidone核准後的使用期間所發現的不良反應，由於這些反應乃是由不特定大小的族群主動通報而得，因此無法確切估算其發生頻率或確立其與使用藥物之因果關係：血管性水腫、肌肉僵直/緊張、關節塞、夢遊、舌頭腫大、血栓性血小板減少性紫斑症、尿失禁、以及尿滯留。

在上市後使用期間，在先前可耐受口服用risperidone或口服用paliperidone的病人中，曾有於注射INVEGA SUSTENNA®後發生過敏性反應的案例報告。

Paliperidone乃是risperidone的主要活性代謝物。使用口服用risperidone與risperidone長效注射劑者所通報的不良反應可參見這些產品之包裝說明書中的『*不良反應(6)*』段落。

7 藥物交互作用

7.1 會與INVEGA SUSTENNA®發生臨床重要交互作用的藥物

由於paliperidone palmitate會水解成paliperidone【*參見臨床藥理學(12.3)*】，因此，在評估發生藥物-藥物交互作用的可能性時，應將口服用paliperidone的研究結果納入考慮。

表13. 與INVEGA SUSTENNA®相關具臨床重要性的藥物交互作用

併用藥物的名稱或類別	臨床原理	臨床建議
中樞性藥物和酒精	考量到paliperidone對中樞神經系統的主要作用，併用中樞性藥物和酒精可能會調節INVEGA SUSTENNA®對中樞神經系統的影響。	併用INVEGA SUSTENNA®與其他中樞性藥物和酒精須謹慎【*參見不良反應(6.1, 6.2)*】。
可能會引發直立性低血壓的藥物	由於INVEGA SUSTENNA®可能會引發直立性低血壓，因此，將之與具此作用的治療藥物併用時，可能會出現加成作用【*參見臨床藥理學(12.2)*】。	對容易發生低血壓的病人，應監測其姿勢性生命徵象【*參見臨語和注意事項(5.7)*】。
強效的CYP3A4與P-gp誘導劑(如carbamazepine、rifampin或聖約翰草)	將paliperidone與強效的CYP3A4及P-gp誘導劑併用可能會降低paliperidone的曝藥量【*參見臨床藥理學(12.3)*】。	在INVEGA SUSTENNA®的1個月投藥間隔期間，如果可能的話，應避免使用CYP3A4及/或P-gp誘導劑。如果必須投予強效的誘導劑，應考慮使用paliperidone持續性藥效註冊療病人【*參見劑量與用法(2.5)*】。
Levodopa和其他多巴胺作用劑	Paliperidone可能會拮抗levodopa及其它多巴胺作用劑的作用。	視臨床需要對病人進行監視與治療。

7.2 與INVEGA SUSTENNA®不會發生具臨床重要性之交互作用的藥物

INVEGA SUSTENNA®與valproate (包括valproic acid與divalproex sodium)預期並不會發生具臨床意義的藥物動力學交互作用。根據口服用paliperidone的藥物動力學研究，與paliperidone合併投予時，並不須調整INVEGA SUSTENNA®的劑量【*參見臨床藥理學(12.3)*】。此外，與INVEGA SUSTENNA®合併投予時，也不須調整valproate的劑量【*參見臨床藥理學(12.3)*】。

鋰鹽與INVEGA SUSTENNA®之間產生藥物動力學交互作用的機會不大。

Paliperidone預期並不會和透過細胞酵素P-450同功酵素代謝的藥物發生具臨床重要性的藥物動力學交互作用。體外研究顯示，CYP2D6與CYP3A4可能涉及paliperidone的代謝；不過，在活體試驗中，並無任何證據顯示這些酵素的抑制劑會對paliperidone的代謝造成明顯的影響。Paliperidone並非CYP1A2、CYP2A6、CYP2C9及CYP2C19的作用受質；因此，不太可能會與這些酵素的抑制劑或誘導劑發生交互作用【*參見臨床藥理學(12.3)*】。

8 特殊族群之使用

8.1 懷孕

孕婦哺乳登錄中心

目前美國已設立了一個孕婦哺乳登錄中心，藉以監視於懷孕期間暴露於非典型抗精神病藥物(包括INVEGA SUSTENNA®)之婦女的懷孕結果。歡迎健康照護人員透過電話1-866-961-2388或網站*http://womensmentalhealth.org/clinical-and-research-programs/pregnancyregistry/*聯繫非典型抗精神病藥物國家孕婦登錄中心。

風險總結

新生兒在懷孕第三期間接觸到抗精神病用藥，可能會在出生後產生鐘體外症狀和/或戒斷症狀(*參見臨床考量*)。整體而言，暴露於paliperidone之孕婦方面的已發表流行病學研究中的現有資料並未確定是否有重大出生缺陷、流產或母體或胎兒不良結果方面的藥物相關風險(*參見數據*)。在懷孕期間，未加治療的思覺失調症及暴露於抗精神病藥物(包括INVEGA SUSTENNA®)都會使母親面臨風險(*參見臨床考量*)。管在投予單劑INVEGA SUSTENNA® 126天後之成人受試者的血漿中檢出paliperidone【*參見臨床藥理學(12.3)*】，但於懷孕前或懷孕期間之任何時間點投予INVEGA SUSTENNA®的臨床意義仍然不明。

目前並不確知本品適用族群發生重大出生缺陷與流產的估計背景風險。所有的懷孕都有發生出生缺陷、流產或其他不良結果的背景風險。在美國的一般人口中，經臨床確認之孕婦發生重大出生缺陷與流產的估計背景風險分別為2-4%與15-20%。

在動物生殖研究中，對懷孕大鼠於器官發生期間肌肉注射劑量最高達人類最高建議劑量(MRHD) (234毫克paliperidone)之10倍(以mg/m²體表面積為比較基礎)的paliperidone palmitate之後，並未在仔鼠身上發現任何治療相關影響。對懷孕的大鼠及兔子於器官發生期間口服投予劑量最高達MRHD (12毫克paliperidone)之8倍(以mg/m²體表面積為比較基礎)的paliperidone之後，胎兒畸形的發生率並未出現升高的現象。也曾以口服投予的risperidone (會廣泛轉化成paliperidone)進行類似的生殖毒性研究(*參見動物數據*)。

臨床考量

疾病相關母體及/或胚胎/胎兒風險

未加治療的思覺失調症會使母親面臨風險，包括復發、住院及自殺的風險增加。思覺失調症與第1型雙極性疾患會伴隨不良生產結果增加，包括早產。目前並不確知這是否是此疾病或其他合併因素的直接結果。

胎兒/新生兒不良反應

在曾於第3孕期暴露於抗精神病藥物(包括INVEGA SUSTENNA®)的新生兒中，曾有發生鐘體外症狀及/或戒斷症狀的報告，包括激動不安、肌張力亢進、肌張力低下、餵料、嗜睡、呼吸窘迫及餵食障礙。這些症狀的嚴重程度不盡相同。需監控已經產生鐘體外症狀及/或戒斷症狀之新生兒，並針對症狀採取適當的處置措施。有些新生兒無須特別治療在幾小時或幾天內即可復原，有些則需要較長的住院時間。

試驗資料

人體試驗資料

在已發表的觀察性研究資料、出生登記資料、以及於懷孕期間使用非典型抗精神病藥物的病例報告中，皆未指出抗精神病藥物與重大出生缺陷之間存有明確的關聯性。一項包含6位使用risperidone (paliperidone的母成分)治療之婦女的前瞻性觀察研究顯示，risperidone與paliperidone會通過胎盤。一項以涵蓋9258位曾於懷孕期間暴露於抗精神病藥物之婦女的Medicaid資料庫為依據的追溯性世代研究顯示，發生重大出生缺陷的風險並無整體性的升高現象。在涵蓋1566位曾於第1孕期暴露於risperidone (paliperidone的母成分)之婦女的子群中，發生重大出生缺陷(RR=1.26，95% CI 1.02-1.56)及心臟畸形(RR=1.26，95% CI 0.88-1.81)的風險有小幅升高的現象；不過，並無任何作用機制可解釋這種畸形發生率的差異。

動物試驗資料

對懷孕大鼠於器官發生期間肌肉注射劑量最高達250毫克/公斤的paliperidone palmitate持續性藥效注射懸浮劑(以mg/m²體表面積為比較基礎，相當於MRHD (234毫克paliperidone)的10倍)之後，並未在仔鼠身上發現任何治療相關影響。

在動物生殖研究中，對懷孕的大鼠及兔子於器官發生期間口服投予劑量最高達MRHD (12毫克)之8倍的paliperidone (以mg/m²體表面積為比較基礎)之後，胎兒畸形的發生率並未出現升高的現象。

也曾以口服投予的risperidone (會廣泛轉化成paliperidone)進行額外的生殖毒性研究。在投予劑量相當於3至4倍MRHD (16毫克)之risperidone (以mg/m²體表面積為比較基礎)的懷孕小鼠所生下的仔鼠中曾觀察到顎裂的案例；在4倍MRHD的劑量下會發生母體毒性。在對大鼠和兔子投予劑量最高達6倍MRHD (16毫克/日之risperidone (以mg/m²體表面積為比較基礎)的胚胎-胎兒發育毒性研究中，並無任何證據顯示具有致畸性。對懷孕大鼠投予劑量相當於0.6倍MRHD的risperidone (以mg/m²體表面積為比較基礎)之後，所生下的仔鼠到成年時有學習能力減弱的現象。對懷孕大鼠投予相當於0.5至1.2倍MRHD的劑量之後，子代胎兒的大腦有神經細胞死亡增加的現象；仔鼠的出生後發育與生長有遲緩的現象。

以risperidone所進行的大鼠生殖研究顯示，在較risperidone之MRHD低的口服劑量下(以mg/m²體表面積為比較基礎)曾發生仔鼠死亡；目前並不確知這些死亡是對胎兒或仔鼠直接造成影響所致(參見RISPERDAL®的包裝說明書)。

8.2 授乳

風險總結

已發表之文獻報告的有限資料顯示，paliperidone會出現於人類的乳汁中。在對鏗嚕母乳之單兒的影響或對乳汁生成作用的影響方面，目前並無任何相關的資料；不過，在因鏗嚕母乳而暴露於paliperidone (paliperidone的母成分)的嬰兒中，曾有發生鎮靜、生長遲緩、顫動及雖體外症狀(顫抖及肌肉運動異常)的報告(*參見臨床考量*)。管在投予單劑INVEGA SUSTENNA® 126天後之成人受試者的血漿中檢出paliperidone【*參見臨床藥理學(12.3)*】，但目前並不確知此項發現對鏗嚕母乳之嬰兒的臨床意義。應將鏗嚕母乳對發育與健康的效益和母親對INVEGA SUSTENNA®的臨床需求及鏗嚕母乳之嬰兒因暴露於INVEGA SUSTENNA®或母親的基礎疾病而可能發生的不良影響放在一起考慮。

臨床考量

對因鏗嚕哺母乳而暴露於INVEGA SUSTENNA®的嬰兒，應監視是否發生過度鎮靜、生長遲緩、顫動及雖體外症狀(顫抖及肌肉運動異常)。

8.3 具生育能力的女性與男性

生育力

女性

根據paliperidone的藥理作用(D₂受體拮抗作用)，使用INVEGA SUSTENNA®治療可能會導致血清泌乳激素濃度升高，這可能會促使具生育能力的女性出現可逆性的生育力降低現象【*參見臨語和注意事項(5.10)*】。

8.4 兒童之使用

對<18歲之病人使用INVEGA SUSTENNA®的安全性及有效性尚未確立。

幼年動物研究

在一項針對幼鼠於出生後24至73天期間投予口服paliperidone的試驗中，學習與記憶的測驗結果有減弱現象(僅見於雌鼠)但此現象為可逆轉的，無影響劑量為0.63 mg/kg/day，此劑量所達到的血中濃度(AUC)和投予12毫克/日之劑量的人類青少年相當。在最高試驗劑量(2.5 mg/kg/day)下，在神經行為或生殖發展方面皆未發現任何其他具一致性的影響，此劑量所達到的paliperidone血中濃度為人類青少年的2-3倍。

在年幼物鼠上持續四十週給予口服risperidone (其在動物及人體均大量代謝為paliperidone)，劑量分別為0.31、1.25或5 mg/kg/day。結果發現骨長及骨密度有減少的現象，無影響劑量為0.31 mg/kg/day，此劑量所達到的血中濃度(AUC；risperidone加paliperidone)與人類兒童及青少年服用MRHD劑量之risperidone時相似。此外，無論是雄性或雌性，在所有劑量都觀察到性成熟延遲。上述影響在經過為期12週停藥恢復期後，仍在雌性上觀察到相少恢復或完全不可逆。

對於INVEGA SUSTENNA®在成長及性成熟的長期影響，尚未在兒童及青少年上完全評估。

8.5 老年人之使用

由於INVEGA SUSTENNA®的臨床研究並未收錄足夠的65歲(含)以上的受試者，因此無法確認其治療反應是否不同於較年輕的受試者。其它見於報告的臨床經驗皆未發現老年病人與較年輕的病人間存有任何治療反應方面的差異。

本品已知主要都是經由腎臟排出體外，因此在腎功能缺損的病人中會出現廓清率降低的現象【*參見臨床藥理學(12.3)*】，對此類病人應降低劑量。由於老年病人較容易併有腎功能減弱的問題，因此在選擇劑量時應謹慎，監測腎功能或有助益【*參見劑量與用法(2.5)*】。

8.6 腎功能缺損

INVEGA SUSTENNA®並不建議用於中度或重度腎功能缺損(肌酸酐廓清率<50毫升/分鐘)的病人。對輕度腎功能缺損(肌酸酐廓清率≥50毫升/分鐘至<80毫升/分鐘)的病人，INVEGA SUSTENNA®的劑量需要減少【*參見劑量與用法(2.5)和臨床藥理學(12.3)*】。

8.7 肝功能缺損

目前尚未曾進行過對肝功能缺損病人使用INVEGA SUSTENNA®的研究。根據一項以口服用paliperidone所進行的研究，對輕度或中度肝功能缺損的病人，並不須調整劑量。目前尚未曾進行過對嚴重肝功能缺損病人使用paliperidone的研究【*參見臨床藥理學(12.3)*】。

8.8 罹患帕金森氏症或路易氏體型失智症之病人

罹患帕金森氏症或路易氏體型失智症之病人對於INVEGA SUSTENNA®的效果感受性曾增強。症狀包含意識混亂、遲鈍、姿勢不穩並經常跌倒、鐘體外症狀和與抗精神病藥物腦性症候群相符的臨床特徵。

9 藥物濫用與依賴性

9.1 管制物質

INVEGA SUSTENNA® (paliperidone)並不屬於管制物質。

9.2 濫用

目前尚未曾系統性地針對動物或人類研究過paliperidone發生濫用現象的可能性。

9.3 依賴性

目前尚未曾系統性地針對動物或人類研究過paliperidone發生耐受性或生理依賴的可能性。

10 過量

10.1 人類的經驗

在INVEGA SUSTENNA®的上市前研究中並無任何使用過量的病例報告。由於INVEGA SUSTENNA®必須由健康照護專業人員投藥，因此，個別病人用藥過量的可能性極低。

Paliperidone使用過量的經驗極為有限，在口服用paliperidone之上市前試驗中所報告的少數過量病例當中，最高估計攝入量為405毫克。所觀察到的徵兆與症狀包括鐘體外症狀與步態不穩。其它可能發生的徵兆與症狀包括paliperidone的已知藥理作用更加擴大的結果，亦即困倦與鎮靜、心搏過速與低血壓、以及QT間期延長。尖端扭轉型心室性心搏過速(Torsade de pointes)與心室纖維顫動曾發生於一個口服paliperidone過量的病例。

Paliperidone乃是risperidone的主要活性代謝物。Risperidone使用過量的經驗可參見risperidone之包裝說明書中的『過量』段落。

10.2 過量時的處置方式

聯絡該醫治的毒物管制中心尋求處理INVEGA SUSTENNA®過量的最新資訊。

提供支持性療法，包含密集的醫療監視及觀察。治療方式應由治療一般其他藥品過量時之方法所組成。應考慮涉及多種藥物的情形。確保維通的氧通、氧氣供應與通氧量，進行心律監測和生命徵狀。使用支持性及症狀性的療法。Paliperidone並無特定的解毒劑。

在評估治療的必要性與病人是否恢復正常時，應考慮到INVEGA SUSTENNA®的延長釋出特性，以及paliperidone半衰期較長的狀況。

11 產品說明

INVEGA SUSTENNA®含有paliperidone palmitate成分。此活性成分paliperidone是一種化學分類屬於benzisoxazole衍生物的非典型抗精神病藥物，INVEGA SUSTENNA®含有由(+)-外(+)-paliperidone palmitate所構成的消旋混合物。其化學名為(9RS)-3-【2-【4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl】ethyl】-2-methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-4*H*-pyrido【1,2-*a*】 pyrimadin-9-yl hexadecanoate。其分子式為$C_{39}H_{57}FN_4O_4$，分子量為664.89。其結構式為：



(±)

Paliperidone palmitate極微溶於乙醇和甲醇，幾不溶於聚乙二醇400和丙二醇，且極微溶於乙酸乙酯。

INVEGA SUSTENNA®為白色至灰白色的無菌水溶性持續性藥效肌肉注射用懸浮液，單劑量預充填針筒的paliperidone palmitate的劑量規格(遞送量)如下：39毫克(0.25毫升)、78毫克(0.5毫升)、117毫克(0.75毫升)、156毫克(1.0毫升)與234毫克(1.5毫升)。本品會水解成活性成分paliperidone，分別形成25毫克、50毫克、75毫克、100毫克與150毫克之paliperidone。非活性成分包括polysorbate 20 (12毫克/毫升)、polyethylene glycol 4000 (30毫克/毫升)、citric acid monohydrate (5毫克/毫升)、disodium hydrogen phosphate anhydrous、sodium dihydrogen phosphate monohydrate、sodium hydroxide以及water for injection。

INVEGA SUSTENNA®係盛裝於附有保鮮活塞及頭蓋(淺化丁基橡膠)的單劑量預充填針筒(環繞短型合物)中。包裝中還附有2支安全針頭(一支1½吋的22號安全針頭，以及一支1吋的23號安全針頭)。



圖2：內在因素對paliperidone之藥物動力學的影響

內在因素對paliperidone之藥物動力學的影響
paliperidone的倍數變化與90% CI

(未使用會發生交互作用的藥物)的變化

圖1：其它藥物對paliperidone之藥物動力學的影響

INVEGA SUSTENNA®與valproate (包括valproic acid與divalproex sodium)預期並不會發生具臨床意義的藥物動力學交互作用。口服投予divalproex sodium持續性藥效錠(2顆500毫克錠劑每日一次，於穩定狀態下)及口服用的paliperidone持續性藥效錠會導致paliperidone的C_{max}與AUC升高約50%。

在13位穩定使用divalproex sodium持續性藥效錠治療的病人中，口服投予paliperidone之後，divalproex sodium持續性藥效錠的穩定狀態C_{max}與AUC並未受到影響。在一項臨床研究中，針對使用穩定劑量之divalproex sodium持續性藥效錠治療的受試者，在其既有的divalproex sodium持續性藥效錠療程中加入口服用paliperidone持續性藥效錠之3-15毫克/日之後，valproate的平均血中濃度仍大致相當【*參見藥物交互作用(7.2)*】。

體外研究顯示，CYP2D6與CYP3A4可能涉及paliperidone的代謝，不過，在活體試驗中，並無任何證據顯示這些酵素的抑制劑會對paliperidone的代謝造成明顯的影響；這些酵素的作用僅佔全身廓清率的一小部份。體外研究顯示，paliperidone乃是P糖蛋白(P-gp)的作用受質【*參見藥物交互作用(7.2)*】。

以人類肝臟微粒體所進行的體外研究顯示，paliperidone對透過細胞色素P-450同功酵素(包括CYP1A2、CYP2A6、CYP2C8/9/10、CYP2D6、CYP2E1、CYP3A4和CYP3A5)代謝之藥物的代謝作用並不會產生明顯的抑制作用。因此，paliperidone預期並不會對經由這些代謝途徑代謝之藥物的廓清作用產生具臨床關聯性的抑制作用。Paliperidone預期也不具有酵素誘導作用。

Paliperidone在高濃度下是一種弱效的P-gp抑制劑。目前並無任何體外資料說明能否藉由增加paliperidone的吸收而增加地高辛的血漿濃度。

特殊族群的研究

目前尚未針對特殊族群進行過任何特定的INVEGA SUSTENNA®藥物動力學研究。所有的資訊都是源自口服用paliperidone的研究，或是以口服用paliperidone及INVEGA SUSTENNA®的族群藥物動力學模型研究為基礎。Paliperidone在特殊族群(腎功能缺損、肝功能缺損及老年人)中的曝藥量如圖2所示【*參見劑量與用法(2.5)及特殊族群之使用(8.6)*】。

對中度肝功能缺損之病人口服投予paliperidone之後，雖然paliperidone的總曝藥量因蛋白質結合率降低而出現下降的現象，但游離paliperidone的血中濃度和健康受試者大致相當。目前尚未針對嚴重肝功能缺損的病人進行過paliperidone的研究【*參見特殊族群之使用(8.7)*】。

對老年受試者口服投予paliperidone之後，和較年輕的受試者相比較，C_{max}與AUC會升高1.2倍。不過，可能會出現與年齡相關的肌酸酐廓清率降低的現象【*參見劑量與用法(2.5)及特殊族群之使用(8.5)*】。

表15：針對有基礎病史之思覺失調症病人所進行之長期、隨機、彈性劑量研究的綜合終點指標的各項組成(思覺失調症研究6)

事件類型	INVEGA SUSTENNA® N=226 發生頻率(%)	口服抗精神病藥物 N=218 發生頻率(%)	風險比率[a] [95% CI]
首次發生的治療失敗	90 (39.8%)	117 (53.7%)	0.70 [0.53, 0.92]
各項首次治療失敗事件			
遺漏及/或禁細	48 (21.2%)	64 (29.4%)	
因精神疾病而住院治療	18 (8.0%)	26 (11.9%)	
因安全性或耐受性問題而停止使用抗精神病藥物治療	15 (6.6%)	8 (3.7%)	
因療效不足而添加另一種抗精神病藥物輔助治療	5 (2.2%)	6 (2.8%)	
必須接高精神病醫療服務的屬做，以避免因精神疾病而緊急住院治療	3 (1.3%)	4 (1.8%)	
因療效不足而停止使用抗精神病藥物治療	1 (0.4%)	9 (4.1%)	
自殺	0	0	
遺漏及/或禁細或因精神疾病而住院治療事件，不論是否為首次發生的事件[b]	76 (33.6%)	98 (45.0%)	0.70 [0.52, 0.94]

[a] INVEGA SUSTENNA®相較於口服抗精神病藥物的風險比率乃是以時間-事件分析的Cox回歸模型為依據。請注意，風險比率在整個試驗過程中並非固定不變。
[b] 將份量病人珍服使所收集到的相關事件納入分析的結果和此項預設次要終點指標分析的結果大致相當。

14.2 分裂情感障礙症

維持治療-使用本品做為本治療特次做為情緒穩定劑或抗鬱劑的輔助用藥(SAll 研究1：SCA-3004)

對分裂情感障礙症病人使用INVEGA SUSTENNA®維持症狀控制效果的療效已在一項長期、雙盲、安慰劑對照性、彈性劑量、隨機分組停藏研究中獲得確立，這項研究的設計目的為延遲符合DSM-IV疾病持續性臨床診斷標準(通過DSM-IV疾病持續性臨床診斷標準)之成人受試者的復發時間。研究對象包括患有雙極性及憂鬱型分裂情感障礙症的受試者。受試者曾使用INVEGA SUSTENNA®做為單一治療藥物或做為穩定劑量之抗鬱劑或情緒穩定劑的輔助用藥。

這項研究有一個為期13週的開放性彈性劑量(INVEGA SUSTENNA® 78毫克、117毫克、156毫克或234毫克)導入階段，此階段共收錄667位有下列現象的受試者：1)精神病症狀急性惡化；2)在妄想、思考欠組織、幻覺行為、興奮、多疑/被害感)、敵意、不合作、緊張及物動控制不良等PANSS評估項目中有≥3項的評分≥4；以及3)在精氏躁症量表(YMRS)及/或Hamilton憂鬱量表-21項目版(HAM-D-21)中的明顯情緒症狀評分≥16。受試者的年齡為19至66歲(平均39.5歲)，並有53.5%為男性。開放性納入階段的各項評估的平均分數為PANSS總分85.8 (範圍：42至128)、HAM-D-21評分20.4 (範圍：3至43)、YMRS評分18.6 (範圍：0至50)、CGI-S-SCA評分4.4 (範圍：2至6)。

經過為期13週的開放性彈性劑量INVEGA SUSTENNA®治療階段之後，有432位受試者符合病情穩定的標準(PANSS總分≤70、YMRS評分≤12、ILHAM-D-21評分≤12)，並隨機進入為期12週的開放性固定劑量穩定治療階段。

共有334位維持12週符合病情穩定標準的受試者於隨機雙盲維持治療階段中服用接受相同劑量之INVEGA SUSTENNA®的治療或接受安慰劑治療。在164位隨機分配進入INVEGA SUSTENNA®組的受試者中，使用劑量的分佈情形為78毫克(4.9%)、117毫克(9.8%)、156毫克(47.0%)或234毫克(38.4%)。主要的療效評估變數為出現復發現象的時間。復發的定義為首次出現一種(含)以上之下列現象的時間：1)因精神疾病而住院治療；2)為避免住院而施行介入治療；3)具臨床意義的自殘行為、自殺或殺人念頭或暴力行為；4)以下任一個的PANSS評估項目的評分≥6 (若幾機分組時的評分≤4)：妄想、思考欠組織、幻覺行為、興奮、多疑/被害感、敵意、不合作或物動控制不良；5)在7天內的連續兩次評估中：PANSS總分升高≥25%(若幾機分組時的評分≥45)或升高≥10分(若幾機分組時的評分<45)；以下任一個別PANSS評估項目的評分≥5 (若幾機分組時的評分<3)：妄想、思考欠組織、幻覺行為、興奮、多疑/被害感、敵意、不合作或物動控制不良；CGI-S-SCA整體評分增加≥2分(若幾機分組時的評分為1 [無症狀]至3 [輕度症狀])或增加≥1分(若幾機分組時的評分≥4 [中度或症狀更嚴重])。

治療組之間在出現復發現象的時間方面有統計學上明顯的差異，且較有利於INVEGA SUSTENNA®組。各治療組之復發時間的Kaplan-Meier圖如圖5所示。

圖5：隨時間之累計復發受試者比例的Kaplan-Meier圖(SAll研究1)



表16依子試驗群(單一藥物治療與輔助治療)及首次出現復發現象時的症狀類型列出整體受試族群中出現復發現象的受試者人數。

表16. 復發事績要(SAll研究1)

	出現復發現象的受試者人數(百分比)	
	安慰劑 N=170	INVEGA SUSTENNA® N=164
所有受試者	57 (33.5%)	25 (15.2%)
單一藥物治療子群	N=73	N=78
	24 (32.9%)	9 (11.5%)
抗鬱劑或情緒穩定劑之輔助治療子群	N=97	N=86
	33 (34.0%)	16 (18.6%)
精神病症狀[a]	53 (31.2%)	21 (12.8%)
情緒症狀[b]		
任何情緒症狀	48 (28.2%)	18 (11.0%)
躁症	16 (9.4%)	5 (3.0%)
憂鬱	23 (13.5%)	8 (4.9%)
混合	9 (5.3%)	5 (3.0%)

[a] 有8位受試者出現復發現象但未出現精神病症狀。
[b] 有16位受試者出現復發現象但未出現任何情緒症狀。

16 包裝規格/貯存與操作

INVEGA SUSTENNA®為白色至灰白色的無菌水溶性持續性藥效型肌肉注射用懸浮液，其劑量規格包括內含39毫克、78毫克、117毫克、156毫克與234毫克paliperidone palmitate的單劑量預充填針筒注射劑。單次用包裝的內容包括一支預充針筒、止回器(Backstop) 及2支安全針頭(一支1½吋的22號安全針頭，以及一支1吋的23號安全針頭)。

39毫克paliperidone palmitate (paliperidone 25毫克 e.q.)注射包(NDC 50458-560-01)
78毫克paliperidone palmitate (paliperidone 50毫克 e.q.)注射包(NDC 50458-561-01)
117毫克paliperidone palmitate (paliperidone 75毫克 e.q.)注射包(NDC 50458-562-01)
156毫克paliperidone palmitate (paliperidone 100毫克 e.q.)注射包(NDC 50458-563-01)
234毫克paliperidone palmitate (paliperidone 150毫克 e.q.)注射包(NDC 50458-564-01)

貯存與操作

請貯存於30°C以下。切勿與任何其它產品或稀釋劑混合使用。

17 病人諮詢須知

抗精神病藥物惡性症候群(NMS)

告知病人，曾有報告指出在使用抗精神病藥物期間伴隨發生一種可能致命的不良反應：抗精神病藥物惡性症候群(NMS)。惡咐病人、家庭成員、照護者如果出現NMS的徵兆及症狀，應和他們的健康照護人員聯絡或尋求急診室協助。應告訴病人與NMS有關的急診室或醫師的聯絡資訊。高燒、肌肉僵硬、心智狀態改變包含譫妄、以及自律神經失衡的跡象(腦搏或血壓失調、心跳速率、發汗與心律不整)【*參見警語和注意事項(5.3)*】。

遲發性運動異常

告知病人遲發性運動異常的風險、如何辨識高血糖與糖尿病的症狀以及進行特定監測(包括血糖、血脂及體重)的必要性【*參見警語和注意事項