

176 X 105mm

舒視平 點眼液0.125%、0.25% Kintropine Eye Drops 0.125%、0.25%

【成分名】

Atropine sulfate

【劑型、含量】

點眼液劑：每ml 含Atropine sulfate 1.25 mg

點眼液劑：每ml 含Atropine sulfate 2.5 mg

【適應症】

散瞳、睫狀肌麻痺。

【用法用量】

本藥限由醫師使用。

A.用於睫狀肌麻痺性折射(屈光)時：

局部用於結膜，1天1~2次，每次1滴。

(1)嬰兒(大至1歲)：使用濃度：0.125%，或由醫師指示使用。

(2)小孩(1至5歲)：使用濃度：0.25%，或由醫師指示使用。

(3)小孩(5歲和大於5歲，且是藍虹膜者)：使用濃度：0.25%，或由醫師指示使用。

(4)小孩(5歲和大於5歲，且是暗虹膜者)：使用濃度：0.5%或1%，或由醫師指示使用。

B.用於葡萄膜炎時：局部用到結膜，使用濃度：0.125%至1%，1天1~3次，每次1滴。

C.用於手術後瞳孔放大時：局部用到結膜，使用濃度：0.5%或1%，1天1~3次或由醫師決定，每次1滴。

【藥理作用】

本品是一種anticholinergic劑，由節後膽鹼神經直接作用於平滑肌和淚腺，它們的藥理作用是由於阻止乙醯膽胺的類副交感神經作用。

【禁忌】

- 1.本品不能用於青光眼，或者有窄角性青光眼傾向之病人。
- 2.本品不能用於先前對Atropine產生嚴重全身反應之小孩。

【警告】

過量使用於小孩和對某特定過敏體質者，可能會產生全身中毒症狀時，應停止使用和使用適當藥物，如述於“過量”部份治療。

【致癌性、突變性、不孕症】

還沒有產生這些病例之研究報告。

【懷孕婦女】

1.本品還未做動物生殖研究，也不知道是否能夠造成胎兒傷害，或影響

生殖能力。

2.本品可應用於孕婦(僅當清楚需要時)。

【幼兒】

請看禁忌及警告部份。

【副作用】

- 1.長久使用時可能引起全身反應，眼瞼過敏反應，局部刺激、充血、腫大、結膜濾泡增殖炎或者皮膚炎。
- 2.使用時，會有畏光及近距離調節力不足之現象。

【過量】

一般症狀和Atropine中毒症狀，包括：口乾、皮膚過敏、發燒、精神錯亂、心悸、臉部發紅，如果有過量現象，應使用水或0.9%食鹽水沖洗，必要時可用縮瞳劑。

如果意外攝取時(吞食時)：1.使用4%單寧酸使之嘔吐或洗胃。

2.使用5mg之毛果芸香鹼(Pilocarpine)口服直至口濕潤為止(必要時間隔投與)。

假如需要全身支持措施時：如下表

1.呼吸衰竭時：氧氣筒和人工呼吸。

2.尿液滯留時：插入導管利尿。

3.發燒：用酒精擦拭。

當用於已用短作用之Barbiturates 鎮靜劑為控制刺激(Excitement)狀態時，須非常小心。

【賦形劑】

Boric Acid、E.D.T.A. Disodium、Methyl Paraben、Sodium Hydroxide、Water for injection。

【貯存】

請貯存於25°C以下避光處。

本品應置於小孩拿不到的地方。

【包裝】

100毫升以下塑膠瓶裝。

0.125%:衛署藥製字第049016號
G-9783

0.25%:衛署藥製字第049186號
G-9915

藥 商：**健喬信元醫藥生技股份有限公司**
新竹縣湖口鄉工業一路6號

委託製造廠：**景德製藥股份有限公司** 桃園廠
桃園市蘆竹區長安路一段80號、148號2樓至7樓