

加斯克兒錠40毫克 (聚二甲矽烷)

Kascoal Tablets 40mg (Dimethylpolysiloxane)

衛署藥製字 第 029828 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2022-05-06

【作用】

本藥的成分為Dimethylpolysiloxane，廣被應用於解除因消化器官疾病引起的腹脹症狀。

本藥具有消泡作用，對於胃腸內能藉由降低氣泡的表面張力幫助氣體以打嗝或是排氣方式將氣體排出體外。

1 成分

1.1 有效成分及含量

有效成分及含量：每錠中含Dimethylpolysiloxane.....40mg

1.2 其他成分(賦形劑)

Microcrystalline Cellulose、Colloidal Silicon Dioxide、Talc、Magnesium Stearate、Lactose。

2 用途(適應症)

解除脹氣、緩解氣脹相關症狀。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 曾因本藥成分引起過敏的人。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 3歲以下。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.1 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。

3.4.2 避免陽光直射。

3.4.3 勿超過建議使用量。

4 用法用量

年齡	使用量
成人及3歲以上	一天3至4次，或需要時服用。每次2錠。
3歲以下	請洽醫師診治

5 警語

5.1 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.1.1 若有任何不適情況產生。

5.1.2 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

6 包裝

12~1000錠塑膠瓶、玻璃瓶、鋁箔盒裝。

7 儲存方式

7.1 本藥應置於小兒伸手不及處。

7.2 於25°C以下儲存。

7.3 請在有效期限內使用。

8 類別

醫師藥師藥劑生指示藥品。

9 給胃腸脹氣患者的治療建議

9.1 少吃發酵性食物，如麵包等。

9.2 避免做一切能引起吞嚥空氣的動作，如進食時交談、喝汽水等。

9.3 喝飲料等液體時應慢慢啜飲，避免大口吞嚥。

9.4 進餐時應保持心境平和並且細嚼慢嚥。

9.5 需以藥物治療時，應遵從醫師藥師藥劑生指示，按時正確服藥。

製造廠

永信藥品工業股份有限公司台中幼
獅廠

台中市大甲區日南里工九路27號

藥商

永信藥品工業股份有限公司

台中市大甲區頂店里中山路一段1191號