

鉀補口服液

K-Glu Oral Solution

不得用於注射

【成分】

主成分：Each mL contains：
Potassium Gluconate 312mg

賦形劑：Saccharin Sodium、Citric Acid Monohydrate、Water。

【適應症】

鉀缺乏症。

【用法用量】

本藥須由醫師處方使用。

每天 3~4 次，每次 15mL 與開水或果汁混合後服用，飯後服用。

本藥應持續服用至鉀缺乏症獲得矯正。

【禁忌】(依文獻記載)

下列疾病患者不得使用本藥：

- 對 Potassium Gluconate 或本藥其他成分過敏者。
- 患有嚴重腎臟疾病之病人。
- 患有腎上腺疾病(Addison 氏症)之病人。
- 正服用會滯留鉀離子之利尿劑之病人。

【注意事項】(依文獻記載)

在無醫療人員監測下，患有嚴重腎臟疾病之老年病人不可服用本藥。

應時常檢測血中鉀離子濃度，以避免鉀離子濃度過高。

本藥不建議使用於孕婦及授乳婦。

【交互作用】(依文獻記載)

本藥不得與會滯留鉀離子之利尿劑併用。

【副作用】(依文獻記載)

- 偶有噁心、胃痙攣、嘔吐等症狀。
- 不正常的血中鉀離子濃度過高(特別常發生於腎臟疾病之病人)，則會有意識混亂、血壓降低、心律不整等情形。

【保存條件】

儲存於 25°C 以下。

須置於孩童接觸不到之處。

【包裝】

100 毫升以下塑膠瓶裝。

衛部藥製字第058956號



信東生技股份有限公司
桃園市桃園區介壽路 22 號

54110220 ②