

“應元”胃得朗注射液

Metoclopramide Injection “Y.Y.”

使用含 metoclopramide 成分藥品可能造成遲發性運動障礙 (tardive dyskinesia)，此為出現於臉部、舌頭及四肢非自主性的運動障礙，具有潛在的不可逆性與嚴重性。遲發性運動障礙發生之風險與使用本品治療期間與總累積劑量(total cumulative dose)有正相關性，且分析本品之使用狀態，約 20%病人使用超過 12 週，故不建議長期(超過 12 週)使用本品治療，除非個案是經過評估，其治療效益高於發生 tardive dyskinesia 之風險者。

Metoclopramide 注射液係一種消化機能異常治療劑，對於腦幹之消化機能調整部位具有選擇性作用，故能在不影響胃液分泌及胃液酸度之情況下調整胃腸運動機能，使患有胃部停滯症之胃官能性運動失常患者增加胃蠕動力，並使幽門、十二指腸暢通，以恢復其正常胃排空功能。此外，胃得朗亦具有中樞性及末梢性嘔吐抑制作用，對各種起因之嘔吐及手術後嘔吐預防均有作用，是一多目標性之胃腸官能異常改善治療劑。

【成分】：Each ml contains:

Metoclopramide Hydrochloride.....5mg

賦形劑：

Sodium bisulfite, Benzyl alcohol, Water for Injection。

【藥理特長】：

1. 調整消化管蠕動異常-本劑可調整胃的蠕動，促進幽門前庭部幽門、十二指腸之暢通。解除胃部停滯，對於食慾不振、噁心、腹部膨脹感等症狀有顯著效果。
2. 抑制中樞性嘔吐及末梢性嘔吐-本劑對於 Apomorphine 及硫酸銅之催吐作用具有拮抗作用，作用強，口服時為 Chlorpromazine 之 35 倍強，皮下注射 19 倍強。對於各種噁心、嘔吐均能奏效。亦可用為手術後嘔吐之預防。
3. 作用具有選擇性-本劑作用於腦幹消化機能調整部位，有特異之選擇性，不影響胃液之分泌及其酸度，因而對於過酸性或低酸性之胃腸機能障礙均可使用。而且本劑不致影響胃腸之正常機能。
4. 可用為胃腸 X-ray 檢查之輔助劑。加速 Barium meal 之通過速度，以提早完成 X-ray 檢查。

【適應症】：

預防嘔吐、逆流性消化性食道炎、糖尿病引起之胃腸蠕動異常。

【用法用量】：

成人通常一天 1~2 次，每次 10mg，肌肉注射或靜脈注射。依年齡、症狀、輕重適宜增減。

本藥限由醫師使用。

【注意事項】：

孕婦禁用。

【警語】：

投予新生兒時應特別小心，因新生兒的清除時間較長，可能會造成血中濃度過高。且成人安全性資料不能外推至新生兒族群，使用 metoclopramide 藥品相關的不良反應如肌張力失調 (dystonias) 及錐體外路徑反應 (extrapyramidal reactions)，於小兒族群比起成人更容易發生。

【貯存】：

請置於 25°C 以下貯存。

【包裝】：

2 毫升安瓿，100 支以下盒裝。



應元化學製藥股份有限公司

台灣台南市安平工業區新忠路 26 號 TEL : (06) 2654883 (代表號)