

"健喬"氧化鎂錠

Magnesium Oxide Tablets "Synmosa"

衛署藥製字 第 023521 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2022-08-15

1 成分

1.1 有效成分及含量

每錠中含有：Magnesium Oxide.....250mg。

1.2 其他成分(賦形劑)

Sodium Starch Glycolate、Magnesium Stearate、Talc、Microcrystalline Cellulose 101、Lactose Granule、Silicon Dioxide。

2 用途(適應症)

軟便。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

- 3.1.1 曾因本藥成分引起過敏的人。
- 3.1.2 胃腸道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心的人。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

- 3.2.1 3歲以下。
- 3.2.2 腎功能障礙的人。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

- 3.3.1 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- 3.3.2 連續使用一星期以上。
- 3.3.3 併用其他瀉劑。

3.4 其他使用上注意事項

- 3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。
- 3.4.2 避免陽光直射。
- 3.4.3 勿超過建議使用量。
- 3.4.4 本藥不應長期使用，一旦排便正常，即應停藥。應儘量以含纖維飲食，充分攝取水分及運動來改善便秘。
- 3.4.5 本藥使用期間可能會有腹瀉發生。
- 3.4.6 長期使用會造成電解質不平衡與水份缺乏。

4 用法用量

年齡	劑量	
成人及12歲以上	1-2錠	
6歲以上未滿12歲	1/2-1錠	一日1~2次，一日以2次為限。
3歲以上未滿6歲	1/2-1/4錠	於早晚(或服用間隔須4小時以上)，空腹時(或隨餐)服用。
未滿3歲	請洽醫師診治	初次應使用最小劑量，再視通便情況增減用量。

5 警語

5.1 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
胃腸道	噁心、嘔吐、嚴重腹痛。
其他	發疹等過敏症狀。

5.2 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

- 5.2.1 有任何不適情況產生。
- 5.2.2 腹瀉持續不止或更嚴重。
- 5.2.3 有血便及自發性腸道出血狀況。
- 5.2.4 使用一星期後無效。

6 包裝

2~1000錠塑膠瓶裝。

7 類別

醫師藥師藥劑生指示藥品。

8 儲存方式

25°C以下儲存。



製造廠

榮民製藥股份有限公司

桃園市中壢區中山東路3段447號

藥商

健喬信元醫藥生技股份有限公司

新竹縣湖口鄉工業一路6號