

美普羅錠 500 毫克

MEPRO TABLETS 500mg



036104

【性狀】

Medroxyprogesterone acetate (MPA) 是由 progesterone 衍生而來，為一合成類固醇，口服給藥，結構與天然的 progesterone 相似，不同處在 α -6 位置有 Methyl group 與 17 位置有 acetoxy group。Medroxyprogesterone acetate 具有黃體脂酮的作用與抗求偶性與抗向性腺的活性。在適當的劑量，Medroxyprogesterone acetate 影響內分泌系統與細胞的活性。

【適應症】

不能手術及復發性或轉移性之子宮內膜癌之輔助療法，停經後婦女之乳癌，攝護腺癌及伴有惡病體質之末期癌症。

惡病體質的定義（需符合下列一、二、三條件）：

- 一、瘤繼續惡化成長。
- 二、病人的血液生化檢查有明顯的碳水化合物、脂肪、蛋白質及其他有關能量代謝異常表現，如血液三酸甘油酯過高，高乳酸血症以及低蛋白血症，低蛋白血症以及血糖代謝異常，另外在血液常規檢查方面則有貧血的現象。
- 三、臨床上病人有虛弱、倦怠、肌肉及脂肪組織的消耗喪失現象。

【用法·用量】

本藥須由醫師處方使用。

每日可從 100~1000 mg（高劑量時可分為每天 2~3 次服用），一般低劑量用於子宮內膜癌，高劑量用於末期的轉移性乳癌。Medroxyprogesterone acetate 可與其它的抗贅瘤治療，如化學療法或放射線療法合併治療。

伴有惡病體質的末期癌症：每天 1000 mg，可一次服用或是分為每天 2 次服用。

【禁忌】

血栓靜脈炎，血栓性栓塞的失調，嚴重的肝功能損傷，過期流產，不明原因出血，對藥物過敏者可能發生高血鈣。

【副作用】

與其它黃體素相同，本劑可能引起乳房觸痛、乳溢、陰道異常出血、經期血流異常、閉經、水腫、體重改變、子宮頸糜爛，或異常分泌、膽汁滯留的黃膽，有或沒有潮紅的癢症、精神抑鬱。

【注意事項】

1. 請置於孩童伸手不及處。
2. 懷孕期間不建議使用，因為資料顯示，懷孕早期投予黃體脂酮，可能使胎兒產生先天性的心臟發育不全，如有血栓性栓塞的障礙，突然間局部或全部失明、複視、視乳頭水腫、視網膜血管障礙、偏頭痛發生時，應立刻停止給藥。若有陰道出血，應做適當診斷處理。若要做組織學檢查，應告知檢驗人員，病人曾服用黃體素。雖然用黃體脂酮治療可能遮避更年期的開始，病人年齡並不是絕對的限制因素，曾有精神抑鬱既往病歷的病人或糖尿病病人，應小心觀察。依文獻記載，應注意當長期投予 Medroxyprogesterone acetate 到 beagle 狗，會長出乳房結，有時會變成惡性。

【賦形劑】

Microcrystalline Cellulose 101、Lactose Monohydrate、Polysorbate 80、Povidone K-30、Crosppovidone Micronized、Magnesium Stearate

【包裝】

4~1,000 錠，塑膠瓶、鋁箔盒裝。本藥應儲存於 25°C 以下緊密容器，避光貯存。

G-8978

衛署藥製字第 047788 號

健喬信元醫藥生技股份有限公司

藥商地址：303 新竹縣湖口鄉工業一路 6 號

製造廠名：健喬信元醫藥生技股份有限公司 健喬廠

製造廠址：303 新竹縣湖口鄉工業一路 6 號

SLT0361H