



"杏輝"孟克杏錠

MORCASIN TABLETS "SINPHAR"

衛署藥製字 第 024964 號

本藥須由醫師處方使用

版本日期 2022-11-16

1 性狀

1.1 有效成分及含量

每錠含有：

Trimethoprim 80mg

Sulfamethoxazole.....400mg

1.2 賦形劑

Lactose、Microcrystalline cellulose、Pyrrolidinone polymer、Talc、Magnesium stearate、Carboxymethylcellulose calcium。

1.3 劑型

錠劑。

1.4 藥品外觀

白色圓形錠，一面四方形刻有對折線，一面刻有"SR"。

2 適應症

由革蘭氏陽性菌及陰性菌所引起之呼吸道、泌尿道、腸胃道感染症。

3 用法及用量

3.1 用法用量

通常成人一次二片，小孩6~12歲一次一片，一日三次，六歲以下酌減。

4 禁忌

4.1 對磺胺劑有過敏者。

4.2 孕婦。

4.3 早產兒、新生兒(高膽紅素血)。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

5.1.1 為防有血液障礙，過敏症，而詳細問診。

5.1.2 有血液、肝、腎障患者，過敏性體質者，應慎重投與。

5.1.3 嚴重皮膚不良反應(SCARs):上市後曾有嚴重皮膚過敏反應如史蒂文生氏強生症候群(Stevens-Johnson syndrome, SJS)、毒性表皮壞死溶解症(Toxic Epidermal Necrolysis, TEN)、急性廣泛性發疹性膿疱症 (Acute Generalized Exanthematous Pustulosis, AGEP)和藥物反應伴隨嗜伊紅性白血球增高及全身症狀症候群(Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic

Symptoms, DRESS)的案例被通報，其中包括致命的案例。如果出現嚴重皮膚不良反應相關症狀或癥候，應立即停藥並給予適當臨床處置。

6 特殊族群注意事項

目前尚無資訊。

7 交互作用

目前尚無資訊。

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

8.1.1 再生不良性貧血、白血球減少，顆粒球減少，血小板減少，溶血性貧血等。

8.1.2 休克、法陣及光敏感之過敏症。

8.1.3 偶有Stevens-Johnson及Lyell群皮膚症狀。

8.1.4 偶有肝、腎障礙。

8.1.5 偶有發熱、頭痛、末梢神經炎、昏沉狀態、眩暈。

8.1.6 偶有PIE症候群(發熱、咳嗽、喀痰)。

8.1.7 嚴重皮膚不良反應(SCARs)上市後曾有嚴重皮膚過敏反應，包含「史蒂文生氏強生症候群(SJS)、毒性表皮壞死溶解症(TEN)、急性廣泛性發疹性膿胞症(AGEP)和藥物反應伴隨嗜伊紅性白血球增高及全身症狀症候群(DRESS)」的案例被通報，其中包括致命的案例。

9 過量

目前尚無資訊。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

兩種藥物配合後產生新的殺菌效能即由單獨使用時之制菌性轉變為殺菌性且無耐藥性。

10.2 藥效藥理特性

治療範圍廣，吸收迅速，療效持久。

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

11 藥物動力學特性

目前尚無資訊。

12 臨床試驗資料

目前尚無資訊。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

4-1000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝，2000錠塑膠瓶裝。

13.2 效期

111.11.16

依包裝標示。

13.3 儲存條件

25°C以下保存。



杏輝藥品工業股份有限公司

宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號

藥商

杏輝藥品工業股份有限公司

宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號