

"紐約" 新黴素軟膏

NEOMYCIN OINTMENT "N.Y."

內衛藥製字 第 011122 號
醫師藥師藥劑生指示藥品
版本日期 2022-05-06

1 成分

1.1 有效成分及含量

Each gram contains:

Neomycin Sulfate.....5 mg

1.2 其他成分(賦形劑)

Polyethylene glycol 400、Polyethylene glycol 3350

2 用途(適應症)

緊急處理、預防因皮膚外傷(如刀傷、擦傷、刺傷、抓傷、磨傷、輕微燙傷)造成的感染或減緩傷口的感染。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 曾因本藥成分引起過敏。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 3歲以下。

3.2.2 有深部皮膚組織感染或大面積傷口、動物咬傷、嚴重燒燙傷。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.1 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。

3.4.2 避免陽光直射。

3.4.3 勿超過建議使用量或使用次數。

3.4.4 使用部位或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。

3.4.5 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。

3.4.6 本藥限於外用不得內服，亦不得施於眼睛四周或黏膜（如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等）、濕疹、潰爛、龜裂或嚴重外傷的患部。

3.4.7 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。

3.4.8 本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。

3.4.9 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。

3.4.10 請勿使用超過7天以上。

4 用法用量

每日1-3次	局部清潔後，適量均勻塗抹於患部，需要時得以滅菌紗布或繃帶覆蓋。
--------	---------------------------------

5 警語

5.1 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
皮膚	發疹等過敏性皮膚炎。
耳朵	耳毒性。
腎臟	腎毒性。

5.2 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.2.1 若有上述外之其他不適情況產生。

5.2.2 使用7天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。

6 包裝

100公克以下鋁軟管裝、塑膠瓶裝，450公克塑膠瓶裝。

7 類別

醫師藥師藥劑生指示藥品。

8 儲存條件

請於25°C以下陰涼處保存。

製造廠

人人化學製藥股份有限公司中壢廠 桃園市中壢區南園二路3號

藥商

人人化學製藥股份有限公司 桃園市中壢區南園二路3號