



抗黴菌抗生物質

NYT-004  
衛署藥製字第14596號

“永信”

# 寧司泰定 Nystatin

陰道錠

Vaginal Tablets  
"Yung Shin"

3.98cm

抗生素的濫用，尤其是廣效抗生素，在黴菌增殖上佔有很重要的地位，類固醇荷爾蒙干擾病人之免疫機序也常導致黴菌感染，其他如抗滴蟲製劑，避孕藥，糖尿病，X光照射，放射性療法，虛弱，陰道不潔，陰道內pH偏向鹼性.....等也都是重要的因素，一旦感染，則白帶，燒灼，紅腫與強烈的搔癢，而令病人十分困擾，因此有效的陰道念珠菌治療劑之迅速與實乃刻不容緩之要務。

Nystatin為Polyene類之抗生素，可與黴菌、原蟲的細胞膜內之固醇類(Sterols)相結合而改變其滲透性，使其細胞內容物滲出而發揮作用，對於巴西芽生菌(Blastomyces brasiliensis)，皮炎芽生菌(Blastomyces dermatidis)，粗珠菌(Coccidioides immitis)，新生囊珠菌(Cryptococcus neoformans)，絮狀表皮真菌(Epidermophyton floccosum)，莢膜組織漿菌(Histoplasma capsulatum)奧杜盎氏小芽胞菌(Microsporum Audouini)，犬小芽胞菌(Microsporum canis)，鬚瘡小芽胞菌(Trichophyton mentagrophytes)，薔薇色髮癬(Trichophyton rosaceum)，紅色毛髮癬菌(Trichophyton rubrum)，白色念珠菌(Candida albicans)均可奏效，在陰道疾患的治療史上有著輝煌的成效。

**【成 分】** 每錠中含：

Nystatin.....100,000 units

**【賦形劑】**

Sodium Bicarbonate、Sodium Dihydrogen Phosphate、Colloidal Silicon Dioxide、Talc、Magnesium Stearate、Sodium Starch Glycolate、Hydroxypropyl cellulose、Lactose。

**【特 徵】**

1. 本藥作用迅速而確實，通常在開始治療的24~72小時之內可解除症狀。
2. 本藥即使長期連用亦不引起抗藥性。
3. 本藥使用上甚為安全。
4. 本藥不影響陰道內正常細菌之生長，而僅對於各種原蟲，病原性黴菌有選擇性作用。
5. 本藥除當治療劑之外，尚可併用廣效抗生素，以預防念珠菌的過度增殖(Overgrowth)。

**【適應症】**

念珠菌所引起之陰道感染症。

**【用法·用量】**

通常每天1~2錠，藥片先沾水後，置於陰道深部，約需連續2週的治療，（即使在月經期間也不應中斷）。

懷孕婦女可於產前3~6週每天使用1~2錠，以預防新生兒之鵝口瘡。

本藥須由醫師處方使用。

**【注意事項】**

1. 對本藥及與本藥之化學結構相似之化合物有過敏之既往例患者禁用本藥。
2. 全身性：在治療期間如有敏感化或刺激發生時宜停止治療。
3. 致癌性、突變性及生育率之影響：長時期的動物實驗並未發現有致癌性、致突變性或是對生育率有任何影響。
4. 孕婦使用仍須衡量其利弊再投與。
5. 幼兒使用：有關小孩子使用的安全性及有效性尚未確立。
6. 副作用：對各年齡群，即使長期使用者，本藥幾乎無毒性和無敏感性，很少有刺激性或敏感性會發生。

**【保存上之注意】**

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 於25°C以下儲存。
3. 請在有效期限內使用。

**【包裝】**

2~1000錠塑膠瓶、鐵罐、Alu. Foil鋁箔盒裝、PTP鋁箔盒裝。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2141485