

“五福” 普洛拍拉卡因眼藥水 5公絲/公撮

衛署藥製字第 035595號
G-3121

"Wu Fu" PROPARACAINE HYDROCHLORIDE OPH. SOL'N
5mg/ml

處方：每ml中含有

Proparacaine Hydrochloride.....0.5% (5mg)
Benzalkonium chloride, Chlorobutanol, Citric acid,
Sodium citrate, Edetate disodium dehydrate, Glycerin,
Purified water.

藥效：本藥品可穩定神經膜，防止神經受刺激、興奮之始動與傳動之影響而達到麻醉效果。本藥品麻醉效果通常20秒內開始，可持續15分鐘。

適應症：適用於需要快速及短時間之眼科用表面麻醉劑。

禁忌：對於本劑有過敏之患者。

警告：

- (1)甲狀腺機能亢進或心臟病患使用本劑要特別留意。
- (2)表面麻醉劑不宜長時間使用，因長時間使用可能引起角膜傷害，視力喪失或延遲傷口治癒。
- (3)使用本劑時，應防止異物進入眼內並禁止擦柔眼睛。
- (4)孕婦不建議使用，只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。



五福化學製藥股份有限公司
WU FU LABORATORIES CO., LTD.
宜蘭縣蘇澳鎮龍德工業區德興八路九號

副作用：

使用Proparacaine Hydrochloride時，瞳孔擴張或散瞳作用很少被觀察到。對於使用其他局部麻醉藥敏感的患者，此藥物相對是安全的；但有時可能會產生局部或全身的敏感性反應。

使用Proparacaine Hydrochloride於眼睛在建議濃度與劑量通常很少或沒有產生刺激，如：刺痛、灼痛、眼結膜充血、流淚或增加眨眼，然而有些局部地刺激和刺痛可能會持續好幾個小時。

極少數會發生罕見且嚴重立即的過敏反應，包括：急性嚴重瀰漫性的上皮性角膜炎(epithelial keratitis)、產生灰色毛玻璃樣(gray, ground-glass appearance)、大面積的壞死上皮脫落(necrotic epithelium)、角膜產生絲狀物(corneal filaments)；有時候可能出現虹膜炎(iritis)與角膜後彈性層炎(descemetitis)。

曾有指尖乾燥和開裂的過敏性接觸性皮膚炎、角膜上皮軟化和侵蝕、結膜充血和出血的案例報告。

用法及用量：

- (1)深部外科麻醉作業時(如白內障摘除)，局部使用每5分鐘1~2滴連續4~6次。
- (2)異物或縫線摘除前點1~2滴。
- (3)眼內壓測定前點1~2滴。

本藥限由醫師使用。

包裝：100公撮以下瓶裝。

貯存：保存在2°C - 8°C。