



華興製藥

Quinolone 系抗菌劑

“華興” **歐伏菌** 膜衣錠 100 毫克
(歐弗洒辛)

Oflocin F.C. Tablets 100mg “H.S.”
(Ofloxacin)

衛署藥製字第 036508 號 (G-3638)

Fluoroquinolone 類藥品可能與肢體障礙及潛在不可逆嚴重不良反應之發生相關，包括肌腱炎、肌腱斷裂、周邊神經炎及中樞神經系統作用。

使用本藥治療下列適應症時，應保留於沒有其他替代治療選擇時：

- 慢性支氣管炎急性惡化
- 急性非複雜性膀胱炎
- 非複雜性泌尿道感染
- 急性鼻竇炎

《簡介》

Ofloxacin 是一種對革蘭氏陽、陰性菌，皆有抗菌效果的廣效性抗菌劑。對葡萄球菌、溶血性鏈球菌、腸球菌的抗菌活性約為 Norfloxacin 的 2 至 4 倍，而對大腸菌、肺炎桿菌、沙雷氏菌屬、流行性感菌、淋菌等抗菌活性則相當於 Norfloxacin。此外，對 Ampicillin 耐受性之淋菌、Nalidixic acid 耐性之腸內菌及 Gentamycin 耐性之綠膿桿菌等均有良好的抗菌活性。

《成分》

每錠含：Ofloxacin.....100mg

《賦形劑》

Lactose、Starch、Povidone K-30、Magnesium Stearate、Talc、Hydroxypropyl Methylcellulose 15CPS、Titanium Dioxide.

《適應症》

表淺性皮膚感染、泌尿道感染、呼吸道感染症、膽道感染症、耳鼻喉科感染症。

《用法用量》

每日 300mg 至 600mg (3-6 錠)，分二至三回服用，可視情況增減量。
本藥須由醫師處方使用。

《副作用》

1. 有休克症狀，如不舒服、發汗、呼吸困難、血壓低下症狀出現時應停止使用，且應適當處置。
2. 發疹、搔癢等過敏現象出現時停止用藥。
3. 偶有 BUN、Creatinine 上升情形。
4. 偶有 SGOT、SGPT、ALP、r-GTP、Total Bilirubin 值上升情形。
5. 消化器方面：噁心、嘔吐、胃、腹不舒服、下痢、軟便、食慾不振、胃、腹疼痛、胸悶、偶有口渴、口內炎症狀出現。
6. 血液：紅血球、白血球、Hemoglobin、Hematocrit、血小板減少、嗜酸性球增多現象。
7. 精神神經性：可能有失眠、眩暈、頭痛、倦怠感出現。

《警語》

1. 過去使用 quinolone 或 fluoroquinolone 類藥品曾發生嚴重不良反應的病人，應避免使用本藥。
2. 肌腱炎及肌腱斷裂
肌腱炎及肌腱斷裂(好發於阿基里斯腱)，有時為雙側，可能在開始使用 fluoroquinolone 類藥品的 48 小時內很快發生，也可能甚至在停藥數個月後才發生。老年人、腎功能不良、曾進行器官移植或同時併用皮質類固醇的病人會增加肌腱炎及肌腱斷裂的風險，故使用本藥應避免併用皮質類固醇。
當出現肌腱炎的初期徵兆(如疼痛腫脹、發炎)，應停用本藥並考慮使用替代藥物。受到影響的肢體應加以適當的治療(如加以固定)。倘出現肌腱病變的徵兆應避免使用皮質類固醇。
3. 中樞神經系統作用：
(1) 精神相關不良反應
Fluoroquinolone 類藥品可能增加精神相關不良反應，包括中毒性精神病、精神病反應進展至自殺意念/想法、幻覺或妄想；憂鬱或自殘行為如企圖自殺或完成自殺；焦慮、躁動或緊張；精神混亂、瞻妄、失去方向感或注意力無法集中；失眠或做惡夢；記憶力受損。這些反應可能發生在第一次投藥後。建議使用本藥之病人倘出現前述不良反應，應立即告知醫療人員，停用此藥並開始適當的治療。
(2) 中樞神經系統不良反應
Fluoroquinolone 類藥品可能與增加癲癇(痙攣)風險、增加顱內壓(假性腦腫瘤)、頭暈和顫抖有關。此類藥物已知會誘發癲癇或降低癲癇閾值。曾有癲癇重複狀態的通報案例。應小心使用於癲癇病人及已知或疑似患有可能會誘發癲癇或降低癲癇閾值之中樞神經疾病(如嚴重腦動脈硬化、有痙攣病史、腦部血流減少、腦部結構改變或中風)，或具其他可能會誘發癲癇或降低癲癇閾值危險因子(如藥物、腎功能不全)的病人。如發生癲癇應停用本藥並開始適當的治療。
4. 血糖異常
Fluoroquinolone 類藥品可能與血糖異常有關，包括有症狀的高血糖和低血糖，通常發生於同時使用口服降血糖藥物(如 glyburide)或胰島素之糖尿病病人，建議針對這些病人要小心監控血糖值。
曾有嚴重低血糖導致昏迷或死亡的通報案例。如使用本藥之病人發生低血糖反應，應停用本藥並立即開始適當的治療。
5. 流行病學研究報告顯示，使用 fluoroquinolone 類藥品可能增加主動脈瘤及主動脈剝離相關風險，尤其是老年人。
當病人有主動脈瘤疾病之家族史，或經診斷已有主動脈瘤及/或主動脈剝離，或具有加重主動脈瘤及主動脈剝離之危險因子(如：Marfan syndrome、vascular Ehlers-Danlos syndrome、Takayasu arteritis、giant cell arteritis、Behcet's disease、高血壓、已知有主動脈粥樣硬化)時，fluoroquinolone 類藥品需經謹慎評估其效益及風險與其他治療方式後方得使用。建議病人如有突發性腹痛、胸或背痛，應立即就醫。

《注意事項》

1. 對本品曾過敏之患者。
2. 高度腎障害之患者請慎重投予。
3. 懷孕中的投藥之安全性未確定，孕婦或即將懷孕者，應避免投予。
4. 本品會轉移至母乳中，授乳婦避免使用。
5. 小孩投藥之安全性未確定，避免投予。
6. 和 Enoxacin 及 Fenbufen 併用使有痙攣之報告。
7. 和制酸劑併服會減少吸收。
8. 副作用報告顯示 Fluoroquinolone 類抗菌劑可導致肌腱炎或肌腱斷裂，若有肌腱疼痛、發炎、斷裂之情形，應立即停藥。
9. 本藥品具有使重症肌無力惡化之風險，具有重症肌無力患者應避免使用。

《儲存》

儲存於 30°C 以下。

《包裝》

6~1000 錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

本品代號：OFT 133

華興化學製藥廠股份有限公司
彰化縣田尾鄉饒平村四維巷 128 號
服務專線：(04)8832121~6