

"培力" 宜痔平 栓劑  
**Posulin** Suppositories "P.L."

【處方】每個栓劑含：Policresulen 50% 200mg (Eq to Policresulen 100mg)  
Cinchocaine HCl 2.5mg

【賦形劑】Lecithin, Paraffin Wax, Hard Fat, Sodium Hydroxide, Colloidal Silicon Dioxide

【適應症】痔瘡及肛門直腸裂隙和破裂所引起之疼痛、出血、搔癢及發炎。

【用法用量】每天2~3次，每次1個，於排便後塞入。症狀消除後，可改為每天一個栓劑。  
本藥須由醫師處方使用。

【禁忌】

1. 對Cinchocaine過敏者不可使用。
2. 懷孕時必須估算出對母體及胎兒的全部可能危險。在絕對需要時才可以使用。
3. 動物試驗沒有發現任何畸胎形成，使用於懷孕婦女所可能的危險研究報告尚未提出，仍未知道主成分是否會存在哺乳母親的乳汁中。

【副作用】

在開始治療時偶有極輕微的局部不適。如癢、燒灼感。但通常能迅速消退，不須停藥。

【注意】1. 儲存於25°C以下。

2. 注意包裝上的有效期限。

3. 栓劑可能會變色以及包裝可能會破損，但不會影響產品的有效性。

4. 儲存時必須小心，勿讓兒童觸及。

【包裝】4~100粒紙盒裝。



培力藥品工業股份有限公司

地址：407台中市西屯區工業區六路11號

電話：04-23592576 (代表號)

傳真：04-23590992

FKS-D\_03