

# 倍力特® 眼用懸浮液 1%

## 1% PRED FORTE® Ophthalmic Suspension

衛署藥輸字第 018654 號  
本藥須由醫師處方使用

### 每毫升含：

Prednisolone acetate 10mg, benzalkonium chloride 0.06mg, 以及 polysorbate 80, boric acid, sodium citrate, sodium chloride, edetate disodium, hydroxypropyl methylcellulose and purified water, hydrochloric acid, sodium hydroxide.

### 作用機轉：

Prednisolone acetate 為 glucocorticoid，依重量基準計，其消炎作用為 hydrocortisone 之 3~5 倍。glucocorticoids 可抑制水腫，纖維蛋白沉積，微血管擴張，急性發炎反應時吞噬細胞的移動及微血管之增生，膠原沉積和癬痕之形成。

### 適應症：

過敏性眼瞼緣炎，結合膜炎，潰瘍性角膜炎及異物入侵所引起之炎症。

**用法用量：**每次 1~2 滴，每天 2~4 次，開始治療 24~48 小時內劑量可安全地增加到每小時兩滴，但須注意不可過早停藥。

**禁忌症：**急性未治療之化膿性眼發炎，上皮單純性疱疹角膜炎(樹枝狀角膜炎)，牛痘，水痘，及其他病毒感染之眼疾，桿菌感染之眼疾，如眼結核，黴菌感染之眼疾，或任何對主成分過敏者。

### 警語：

1. 有些疾病會引起角膜變薄，使用局部類固醇製劑時易造成角膜穿孔。已知多種眼炎及長期使用局部類固醇製劑會導致角膜或鞏膜變薄，且局部類固醇製劑用於已變薄的角膜或鞏膜上可能造成穿孔。
2. 因為本產品不含抑菌劑，因此當發生感染時必須適當的處置以對抗感染原。
3. 局部類固醇製劑可能會隱藏或加重急性化膿性或未治療感染之眼疾。長期使用可能抑制眼部組織之免疫反應，因而可能增加繼發性眼部感染的可能性。
4. 使用眼用類固醇可能會使眼部病毒性感染(包括單純性疱疹)病程延長或更加惡化。以類固醇治療有單純性疱疹病史之病人必須更加小心，同時應常用裂隙燈顯微鏡檢查。
5. 曾有報告在長期使用局部類固醇時，同時發現有黴菌感染角膜，因此對於持續性角膜潰瘍，不論是曾經或正在使用局部類固醇治療，均須檢查是否有黴菌感染。
6. 有些較敏感病人長期使用局部類固醇時會使眼內壓增加而導致視神經損壞及視野障礙。青光眼病人在使用類固醇時需更加小心。因此應時常檢查眼內壓，特別是有青光眼病史或青光眼病人。
7. 有報告指出，全身性或局部使用類固醇會導致視覺障礙。病人若出現視力模糊或其他視覺障礙的現象，應尋求眼科醫師評估可能的原因，包括白內障、青光眼或罕見疾病如中心性漿液性脈絡膜視網膜病變(Central Serous Chorioretinopathy, CSCR)，這些疾病在使用全身和局部類固醇後曾被報告。
8. 長期且經常使用高劑量局部類固醇製劑之病人，特別是嬰幼兒，需注意是否抑制腎上腺

情況發生。

9. 除眼科醫師處方且定時檢測眼壓外，使用含類固醇之眼藥水不可超過十天以上。
10. 本品含有氯化銨(benzalkonium chloride)，可能被軟式隱形眼鏡吸收或發生隱形眼鏡變色的情況。因此，病人使用本品前需先摘下隱形眼鏡，滴入 15 分鐘後，再重新戴上。
11. 應小心避免本品瓶身或滴管碰觸患部，以防眼睛受傷或感染。不可與他人共用本品以防感染。不使用本品時，應關緊瓶蓋。  
特殊使用族群
12. 用於孕婦：妊娠期間之長期使用或增加劑量時的安全性仍未確定。因此，處方本品於孕婦病人，僅限對胎兒療效益處多於壞處時。於動物試驗中，類固醇的使用顯示有畸胎反應。
13. 用於授乳婦女：對於局部類固醇之使用是否會導致足以產生全身性吸收，並於乳汁中產生可偵測的量，至今仍未知。因此，不建議授乳婦女使用本品。當投與本品於授乳婦女時，應審慎考慮本品對其之重要性。
14. 用於兒童：使用於兒童的安全性及療效尚未確立。
15. 用於老年人：本品於年長和年輕病人使用上，整體療效及安全性並無差異。
16. 對駕車及機械操作之影響：滴入本品後，病人可能感到短暫視力模糊而影響到開車或機械操作的能力。若有前述現象，請勿開車或操作機械，直到視力清晰為止。

### 藥品交互作用：

局部眼用類固醇較少造成全身性不良反應，但與 CYP3A 抑制劑併用時，仍要注意全身性類固醇相關副作用的發生。

### 注意事項：

曾有報告當長期或增量使用局部眼用皮質類固醇後，會發生後囊下白內障。急性前房葡萄膜炎曾發生在易感體質。白內障手術後使用類固醇治療，可能會延後傷口癒合和增加滲入性水泡的發生。如有過敏的徵候或其他嚴重反應發生時，請停用該類固醇藥物。類固醇類藥物之間的交叉過敏反應已有前例可證(請參閱副作用段)。

### 副作用：

眼內壓增加，視神經損壞，視野障礙，後囊下白內障，或使黴菌、病毒引起眼睛再度感染。若角膜或鞏膜變薄而又使用類固醇時，易造成穿孔。使用含類固醇製劑也可能引起急性前房葡萄膜炎或眼球穿孔。偶爾也有散瞳、喪失視覺調節作用、和眼瞼下垂的報告。廣用類固醇時可能會產生全身性副作用。使用局部類固醇後產生全身性皮質類固醇亢進的病例為罕見現象。

### 上市後使用經驗：

下列副作用為本品上市後自發性通報，無法確定其人數、發生頻率或發生原因。  
免疫系統異常：過敏、蕁麻疹  
神經系統異常：頭痛  
視覺異常：囊下白內障、眼睛刺激感、眼睛痛、角膜/鞏膜穿孔、異物感、眼壓升高、瞳孔放大、眼睛充血、眼部感染(包括細菌、黴菌及病毒感染)、視覺模糊/障礙  
腸胃道異常：味覺障礙  
皮膚及皮下組織異常：搔癢、疹子

**過量：**過量使用局部眼藥不會有立即的危險。若不慎

吞食，請喝水稀釋。

**包裝：**5ml, 10ml 塑膠滴瓶。

**貯存方式：**室溫下(15°C-25°C)貯存，不需冷藏或冷凍，請直立擺放，置於小孩不可及之處，使用前請充分搖晃。

版本修訂日期：2018 年 1 月

製造廠：Allergan Pharmaceuticals Ireland  
廠址：Castlebar Road, Westport, County Mayo, Ireland.  
藥商：台灣愛力根藥品股份有限公司  
地址：台北市中正區羅斯福路二段 102 號 9 樓  
電話：(02)2366-9888