



“永信”

# 鼻福<sup>®</sup> Peace

糖漿

Syrup "Yung Shin"

PFS-007  
衛署藥製字第27144號

本藥係為複合性鼻炎治療劑，其可利用擬交感神經興奮劑—Pseudoephedrine Hydrochloride的血管收縮作用使鼻腔黏膜之腫脹消失，並配合抗組織胺劑—Triprolidine Hydrochloride之抗過敏(Antiallergic)及抗膽素性(Anticholinergic)作用，而促使鼻炎之鼻漏現象減輕。此外，本藥亦可緩解打噴嚏、鼻癢及淚眼等症狀。此二成分經適當比例調製，可發揮解除流鼻水、鼻塞、清淨鼻腔及暢通呼吸的效能。

**【成分】** 每mL含有：

Triprolidine Hydrochloride.....0.25 mg  
Pseudoephedrine Hydrochloride.....6 mg

**【賦形劑】**

Sodium Citrate、Ethyl Maltol、Tartrazine、Alcohol、Water Purified、Sugar、Sodium Benzoate。

**【作用】**

1. Triprolidine Hydrochloride為一長效性抗組織胺劑，作用持續時間可達12小時。其兼具擬副交感神經遮斷作用而減輕鼻溢，對於過敏性鼻炎、竇炎等可緩解過敏現象。
2. Pseudoephedrine Hydrochloride係一擬交感神經興奮劑，可使鼻腔、支氣管粘膜血管收縮而減少充血和水腫現象。
3. 本藥綜合上述二成分之抗組織胺，擬副交感神經遮斷及擬交感神經興奮作用，故對於季節性、過敏性鼻炎諸症狀具有療效。

**【適應症】**

感冒、枯草熱、過敏性及血管舒縮性鼻炎所引起之上呼吸道粘膜充血。

**【用法用量】**

成人及12歲以上之兒童，每次10 mL，每天3次，6~12歲每次5 mL。2~5歲每次2.5 mL。6個月~2歲以下，每次1.25 mL。  
本藥須由醫師處方使用。

**【使用上注意事項】**

- 一、有下列情形者，請勿使用：
  1. 曾因本藥成分引起過敏的人。
  2. 服用單胺氧化酶抑制劑(MAOI)的人，或停用MAOI兩星期內，不得服用本藥，如不了解服用的藥品是否含有MAOI，請詢問醫師或藥師。
  3. 使用本藥期間不宜使用鎮靜藥、安眠藥及其他中樞抑制劑。
  4. 懷孕之安全性尚不明確，因此懷孕婦女除非必要，避免使用。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
  1. 6歲以下。
  2. 嚴重代謝性肝腎疾病的人。
  3. 曾診斷有下列疾病的人：心臟病、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、因前列腺肥大引起排尿困難。
  4. 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的。
  5. 授乳之婦女則須考慮停用本藥或停止授乳。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
  1. 可能懷孕婦女及哺乳婦。
  2. 65歲以上。
  3. 服用其他綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鎮痛藥、鼻炎藥或抗過敏藥等的人。
- 四、其他使用上注意事項：
  1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
  2. 避免陽光直射。
  3. 勿超過建議使用量。
  4. 使用前須振搖均勻，並使用內附量器量取藥量。
  5. 不得與酒精性飲料併用。
  6. 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。

**【警語】**

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
神經系統	倦怠感、興奮。
其他	口乾、視覺上之困擾。

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 若有任何不適情況產生。
2. 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

**【保存上之注意】**

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 於25°C以下、避光儲存。
3. 請在有效期限內使用。

**【包裝】**

60~4000毫升塑膠瓶裝、玻璃瓶裝、60毫升塑膠瓶，100支紙盒裝。

★如果您對本產品在使用上有任何疑問，請逕洽服務專線0800-012-679，本公司專業藥師將竭誠為您服務。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2144620