

2. 乳房

乳房觸痛、乳房痛或乳溢。

3. 心血管系統

血栓栓塞疾病，包括血栓靜脈炎及肺栓塞。

4. 腸胃道

噁心、膽汁鬱滯性黃疸。

5. 皮膚

敏感反應，包括荨麻疹、瘙癢、水腫、全身發疹、瘙癢、禿髮與多毛症。

6. 眼睛

眼部的神經性損害，例如視網膜血栓與視神經炎。

7. 中樞神經系統

憂鬱症、失眠、嗜睡、頭暈、頭痛、緊張。

8. 其他

過敏反應(例如過敏與類過敏反應，血管水腫)、播種性或非播種性皮炎(過敏性)、體重改變(增加或減少)、發熱、水腫/體液滯留、倦怠、葡萄糖耐受性減低。

使用雌激素與黃體素併用療法的病人有下列不良反應之報告：

1. 生殖泌尿系統

不正常的子宮出血/點狀出血或月經流量改變、突發性出血、點狀出血、經痛/骨盆腔痛、子宮肌瘤變大、陰道炎包括陰道念珠菌感染、子宮頸分泌量改變、子宮頸外翻、卵巢癌、子宮內膜增生、子宮內膜癌。

2. 乳房

乳房觸痛、變大、疼痛、乳頭分泌物、乳溢、乳房纖維囊腫的變化、乳癌。

3. 心血管系統

深部與表淺靜脈血栓、肺栓塞、血栓靜脈炎、心肌梗塞、中風、血壓升高。

4. 腸胃道

噁心、嘔吐、腹部絞痛、脹氣、膽汁鬱滯性黃疸、膽囊疾病的發生率增加、胰臟炎、肝血管瘤變大。

5. 皮膚

停止用藥時，可能持續有黃褐斑或黑皮病、多形紅斑、結節性紅斑、出血性疹、脫髮、多毛症、瘙癢、皮疹。

6. 眼睛

視網膜血管血栓、無法忍受隱形眼鏡。

7. 中樞神經系統

頭痛、偏頭痛、頭暈、憂鬱症、舞蹈病、緊張、情緒障礙、易怒、癲癇惡化、失智症。

8. 其他

體重增加或減少、碳水化合物耐受性減低、吐嗜紫質沉著症惡化、水腫、關節痛、腿抽筋、性慾改變、荨麻疹、血管水腫、類過敏性/過敏性反應、低鈣血症、氣喘惡化、三酸甘油酯增加。

過量

雌激素與黃體素併用療法用藥過量會引起噁心、嘔吐、乳房觸痛、頭暈、腹痛、昏昏欲睡/倦怠，婦女也可能出現斷藥型出血(withdrawal bleeding)。過量的治療包括停用CE併用MPA，並給與適當的支持性照護。

包裝

普維拉錠(PROVERA Tablet)有下列含量與包裝：

5 mg (淡藍色有刻痕圓形錠) 4-1000粒裝。

10 mg (白色有刻痕圓形錠) 4-1000粒裝。

儲存的室溫控制於20-25°C。

請置於孩童無法取得處。

藥 商：輝瑞大藥廠股份有限公司

地 址：台北市信義區松仁路100號42、43樓

製造廠：Pfizer Italia S.r.L.

廠 址：Localita Marino del Tronto, 63100, Ascoli Piceno, Italy

版本：USPI 201707-2