



"杏輝" 杏化乳膏

SINPHARDERM CREAM "SINPHAR"

衛署藥製字 第 020892 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2023-03-14

杏化乳膏是一種角質軟化劑，能緩解皮膚乾裂現象。

【作用】本藥主成分 Urea 具有角質溶解作用，對腳、掌之異常角化具軟化剝離效果。

1 成分

1.1 有效成分及含量

每gm含：

Urea.....100mg

1.2 其他成分(賦形劑)

原味:

White petrolatum、Liquid petrolatum、Propylene glycol、Cetyl stearyl alcohol、Span 60、Tween 60、Methyl paraben、Propyl paraben、Water purified.

花香味:

White petrolatum、Liquid petrolatum、Propylene glycol、Cetyl stearyl alcohol、Span 60、Tween 60、Methyl paraben、Propyl paraben、Fragrance、Water purified.

2 用途(適應症)

去角質。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 曾因本藥成分引起過敏。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 有深部皮膚組織感染。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.1 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

3.3.2 正在接受醫師治療。

3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。

3.4.2 兒童需於監護者的指導與監督下使用。

3.4.3 避免陽光直射。

3.4.4 勿超過建議使用量或使用次數。

3.4.5 使用部位或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。

3.4.6 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。

3.4.7 本藥限於外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)。

3.4.8 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。

3.4.9 本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。

3.4.10 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。

3.4.11 本藥不是化妝品，不可用於臉部基礎化妝。

3.4.12 患部有下列狀況者，建議不要使用。

1. 有傷口或紅腫。
2. 傷口流膿或潰爛。
3. 傷口有結痂剝離的情形。

4 用法用量

1天1~2次	適量塗於患部
--------	--------

5 警語

5.1 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅、發癢、刺激感。

5.2 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.2.1 若有上述外之其他不適情況產生。

5.2.2 連續使用7天後症狀未改善或更惡化。

6 包裝

1000公克以下塑膠瓶裝、塑膠管裝、積層鋁管裝，3800公克塑膠瓶裝。

7 儲存方式

30°C以下保存。

8 給皮燥患者的治療建議

8.1 避免直接接觸刺激性物質，如：清潔劑或化學藥劑。

8.2 必須在潮濕環境下工作時膚乾應配戴非橡膠材質手套，或在手套內置入棉質內襯。

8.3 選用低皂鹼的香皂及用溫水洗手。

8.4 使用含保濕成分之皮膚藥膏來幫助症狀的改善。

112.03.14



製造廠

杏輝藥品工業股份有限公司

宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號

藥商

杏輝藥品工業股份有限公司

宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號