

"杏輝" 金碘藥水 (普威隆碘)

SINDINE SOLUTION "SINPHAR" (POVIDONE-IODINE)

衛署藥製字 第 019423 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2022-05-06

本藥水為含Povidone-Iodine之殺菌消毒水溶液，刺激性很小為無痛性之碘藥水。

1 成分

1.1 有效成分及含量

每mL含：

Povidone-Iodine 100 mg(相當於有效碘10mg)

1.2 其他成分(賦形劑)

Texapon N70、Disodium Hydrogen Phosphate Anhydrous、Potassium Iodide、Glycerin、Water Purified.

2 用途(適應症)

緊急處理擦傷、切傷、刺傷、抓傷等導致皮外之傷口及傷口周圍的洗淨、消毒、殺菌來防止傷口的感染。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 曾因本藥成分引起過敏。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 3歲以下。

3.2.2 有深部皮膚組織感染或大面積傷口、動物咬傷、嚴重燒燙傷。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.1 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。

3.4.2 避免陽光直射。

3.4.3 勿超過建議使用量或使用次數。

3.4.4 使用部位或其周圍髒汙時，請洗乾淨後再用藥。

3.4.5 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。

3.4.6 本藥限於外用不得內服，亦不得施於眼睛四周或黏膜（如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等）、濕疹、潰爛、龜裂或嚴重外傷之患部。

3.4.7 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。

3.4.8 本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。

3.4.9 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。

3.4.10 有全身性吸收之可能性，因此反覆使用新生兒可能出現甲狀腺功能低下，孕婦及其胎兒及哺乳婦有造成甲狀腺腫及甲狀腺功能低下。

3.4.11 會使皮膚或衣物染色。

4 用法用量

一日數次	塗抹於患部，或以紗布、脫脂棉等沾取塗抹
------	---------------------

5 警語

5.1 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.1.1 若有上述外之其他不適情況產生。

5.1.2 使用7天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。

5.1.3 使用後出現蕁麻疹、浮腫、胸悶等症況，及臉色蒼白、手腳冰冷、冒冷汗、呼吸困難等現象。

6 包裝

4000毫升以下塑膠瓶裝。

7 儲存方式

25°C以下保存。



製造廠

杏輝藥品工業股份有限公司

宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號

藥商

杏輝藥品工業股份有限公司

宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號、新寮路95號、103號(同一廠區)