

"信東"淨菸經皮吸收戒菸貼片2.08毫克 / 平方公分 (尼古丁) 5號、10號、15號 SMOKFREE NICOTINE TDDS 2.08MG/CM 2 (NICOTINE) No.5 No.10 No.15

衛署藥製字 第 038646 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2022-05-06

【藥品說明】

本藥含有尼古丁成分。

1 成分

1.1 有效成分及含量

有效成分及含量：每 5cm²的“淨菸”中含有10.4mg的尼古丁。

每10cm²的“淨菸”中含有20.8mg的尼古丁。

每15cm²的“淨菸”中含有31.2mg的尼古丁。

1.2 其他成分(賦形劑)

Methyl Salicylate、Isopropyl Myristate、Butylated Hydroxytoluene、Polyacrylate Solution。

2 用途(適應症)

幫助戒菸。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 曾因本藥成分引起過敏的人。

3.1.2 孕婦。

3.1.3 曾經對阿斯匹靈或水楊酸有過敏或敏感現象的人。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 有心臟疾病的人。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.1 可能懷孕婦女以及哺乳婦。

3.3.2 首次使用。

3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 當使用本藥時，絕對禁止吸菸，以免造成尼古丁過量而發生中毒現象。

3.4.2 使用本藥不宜超過三個月，因為有可能因過長時間吸收貼劑中的尼古丁而造成對尼古丁

成癮。

- 3.4.3 因為尼古丁具揮發性，若打開後放置太久將失去其效力(strength)，故由鋁箔袋中取出本藥後，需即刻使用，否則請將本藥保存在鋁箔袋中。
- 3.4.4 本貼片膚色底層為鋁箔材質，若貼片使用期間需要進行磁共振造影(Magnetic Resonance Imaging, MRI)掃描檢查時，請於檢查前撕去本貼片，以避免於MRI掃描過程中因過熱而造成皮膚灼傷。
- 3.4.5 當使用完本藥後，必須將其對摺後丟棄，以免讓孩童拿去玩耍。
- 3.4.6 當您使用完本藥之後，請馬上用清水洗手。
- 3.4.7 請至少一星期內都不要再將本藥貼在您已經貼過的部位，並且請勿將同一貼片貼超過24小時。
- 3.4.8 水分對本藥並不會構成傷害，故洗手或洗澡時可不必撕下，但不可用力擦洗貼有本藥之部位，以免脫落。
- 3.4.9 若本藥不慎脫落時，您可以馬上換貼一塊新的，然後在您平常更換本藥的時間撕下。
- 3.4.10 當您首次使用本藥時，若皮膚發生輕微的發癢、發熱或刺痛現象是正常的，此症狀應於1小時內就會消失。在您撕去本藥後，原先貼有本藥的皮膚可能會稍微紅腫，於一天後紅腫即應消失。

4 用法用量

本藥雖有助於戒菸者消除菸癮，但除使用本藥戒菸外，個人戒菸的意志力亦很重要。

本藥經皮吸收戒菸貼片的使用劑量如下表所示：

週數	貼劑大小	健康戒菸者	特殊戒菸者□
2-8週	15 cm ² ×1	12.5 mg/day	—
2-4週	10 cm ² ×1	8.3 mg/day	8.3 mg/day
2-4週	5 cm ² ×1	4.2 mg/day	4.2 mg/day

□體重低於45.5kg的人、每天吸菸量少於10支者、患有心臟血管疾病者。

【使用說明】

- 使用方法
 1. 依箭頭指示 "撕開處" 將鋁箔袋撕開，取出方型膚色貼片。
 2. 透明塑膠襯墊中央波浪紋面朝上，從中央扳開塑膠襯墊。
 3. 左手固定貼片，右手先撕開一邊襯墊，並將膚色面朝上。
 4. 內有粘膠部份，貼在頸部以下至腰部，乾燥、乾淨無毛髮處，如手臂、胸部或腹部。固定一部分貼片，再撕開另一邊襯墊，用力壓住10秒。
 5. 貼24小時後，請取下貼片對摺後丟棄，每天需更換黏貼部位。

5 警語

5.1 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
------	-----

皮膚	較常發生皮膚紅腫或刺痛感，但在短時間內，此症狀即可消失。
神經系統	戒菸後的症狀：神經質、易怒、不安、憂慮、睡眠不安定、注意力不集中、食慾及體重增加、頭痛、肌肉痛、便秘及疲勞等。

5.2 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.2.1 如血壓上升、心跳加快、心絞痛。

5.2.2 有上述之外其他不舒服的狀況發生。

6 包裝

5、10、15平方公分 / 片 / 鋁箔袋裝，100片以下盒裝。

7 類別

醫師藥師藥劑生指示藥品。

8 保存條件

因為戒菸貼劑對熱敏感，故請將本藥儲存於25°C以下。本戒菸貼劑若出現輕微的褪色情形，對貼劑品質無嚴重影響，請安心使用。切記，在夏天的太陽照射下，車內的溫度可能遠高於30°C。

9 衛署藥製字第038646號

10 諮詢專線

0800-231525

製造廠

信東生技股份有限公司

桃園市桃園區介壽路22號

藥商

信東生技股份有限公司

桃園市桃園區介壽路22號