

註：

1. 報核仿單標籤以黏貼全形實物為原則。
2. 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時附送現品並將照相影本代替黏貼報核

108. 5. 28



使皮新軟膏
SPERSIN Ointment

衛署藥製字第 047810 號
G-8987

【藥品說明】

1. 本藥含有三種抗菌成分，可以用於預防皮膚傷口細菌感染。
2. 本藥含有油質的基劑，可以將傷口披上一層阻絕的保護層，並可以縮短傷口癒合的時間。

【成分】

有效成分及含量：每公克之本軟膏含有下列三種主成分抗生素

Neomycin (as Sulfate) 3.5 mg (potency)
Bacitracin (as Zinc) 400 units (potency)
Polymyxin B (as Sulfate) 5000 units (potency)

其他成分(賦形劑)：Liquid Petrolatum, Lanolin (anhydrous), White Petrolatum

【用途(適應症)】

緊急處理、預防因皮膚外傷(如刀傷、擦傷、刺傷、抓傷、磨傷、輕微燙傷)造成的感染或減緩傷口的感染。

【使用上注意事項】

- 有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 - (1) 3 歲以下
 - (2) 有深部皮膚組織感染或大面積傷口、動物咬傷、嚴重燒燙傷
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：兒童、孕婦、可能懷孕及哺乳。
- 其他使用上注意事項：
 - (1) 為防止兒童誤食請妥善保管
 - (2) 避免陽光直射
 - (3) 勿超過建議使用量或使用次數
 - (4) 使用部位或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥
 - (5) 使用本藥前後應徹底洗淨雙手
 - (6) 本藥限於外用不得內服，亦不得施於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)、濕疹、潰爛、龜裂或嚴重外傷之患部。
 - (7) 請注意不要誤入眼睛，萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。
 - (8) 本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。
 - (9) 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
 - (10) 請勿使用超過 7 天以上。

【用法用量】

每日 1-3 次 局部清潔後，適量均勻塗抹(撒佈或噴灑)於患部，需要時得以滅菌紗布或繃帶覆蓋

【警語】

- 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹等過敏性皮膚炎
耳朵	耳毒性
腎臟	腎毒性

藥商地址請依所轄衛生局核定內容刊載

- 使用本藥後，若發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
 - (1) 若有上述外之其他不適情況產生
 - (2) 使用七天後，自覺狀況沒有改善或更惡化

【包裝】

100 公克以下鋁軟管裝，450 公克塑膠瓶裝。

【類別】


醫師藥師藥劑生指示藥品

【製造廠】

 中國化學製藥股份有限公司 新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號 (C)

【委託者】

恆振企業有限公司 台北市永吉路 302 號 4 樓之 2

接受澳洲西格馬大藥廠 SIGMA Pharmaceuticals Pty. Ltd.  **SIGMA**

地址：1408 Centre Road, Clayton, 3168, Victoria, Australia 之授權在台灣製造。