



“永信”

信可得 Shincort

關節注射液

Injection
"Yung Shin"

信可得注射液為具有消炎作用之合成副腎皮質類固醇化合物—Triamcinolone Acetonide之水性懸濁注射液製劑。其主要應用於一般輕、重症型炎性疾患，舉凡嚴重性或長期不癒之關節炎、長期性過敏性鼻炎、過敏性氣喘、慢性濕疹或其他Steroids製劑治療無效者皆可奏效。而直接對所施部位進行強力而顯著之鎮痛及消炎作用，致而迅速且持續性地達到治療效果。由於本藥主成分為水不溶性，且比對於肌肉內或關節腔內注射之其他類固醇類較為難溶於水，是以可期在注射部位之吸收更為緩慢，而呈長時間性之作用，甚且可達1針維持二星期以上之療效，不必每天施以注射，實為現今最具持久性之副腎皮質荷爾蒙注射製劑。

【成分】

信可得關節注射液每mL中含：

Triamcinolone Acetonide 10 mg

【賦形劑】

Carboxymethylcellulose Sodium、Polyvinylpyrrolidone、Polysorbate 80、Benzyl Alcohol、Propylene Glycol、Water For Injection。

【特徵】

- 副作用較他種類固醇類(Steroids)為少：
關節腔內注射時，極少有副腎皮質機能抑制作用或全身性副作用。
- 更大的病患接受性，劑量少，作用長：
肌肉注射不需每日施予，只要間歇性治療而療效持久，故有較長之注射間隔，使病患易於接受治療。且係單一劑量之持續作用，僅需小劑量即可得到預期之效果。
- 注射無痛性，欲達到全身性療效可作關節腔內或其他之局部注射，而達到更佳之治療效果。
- 本藥特別適用於慢性、長期性之痛症及炎症疾患及其他類固醇類(Steroids)治療無效之疾患。

【適應症】

風濕性關節炎、滑囊炎、過敏性皮膚炎、支氣管氣喘、過敏性鼻炎、天疱瘡、過敏性及發炎性眼科疾患。

【用法·用量】

局部注射(關節腔內)：以使用Shincort (10 mg/mL)關節注射液為宜，通常成人約每週注射1~2次或每月注射1~2次。注射劑量一般在1-20 mg之間，可視關節部位、大小、發炎程度及關節液存在多寡而異，每次劑量及相關注射部位，可下表列為參考：

注射部位	每次注射之劑量
膝肩等大關節	5 ~ 15 mg
小關節、滑液囊內、腱鞘內、炎症周圍	2.5 ~ 10 mg
軟組織內	1.0 ~ 5.0 mg
皮內	0.2 ~ 0.4 mg

局部注射時請先將藥液(Shincort 10 mg/mL)關節注射液)充分振盪，使成均一懸濁液，然後以1/2注射針抽取適當量，或必要時可混合局部麻醉劑注射之。關節腔內如有多量之關節液存在時，可將部份關節液抽取取出，然後再注入藥液，以減輕注射時之疼痛及藥效因多量之關節貯留液之稀釋而使藥效降低。

【注意事項】

- 本藥限由醫師使用。
- 曾有文獻報導於硬脊膜外注射(epidural administration)給予皮質類固醇後發生罕見但嚴重的神經系統不良反應，包括視力喪失、中風、癱瘓、死亡等，多數個案發生於懸浮或緩釋劑型之皮質類固醇注射劑成分藥品。
- 本產品含有防腐劑成分，不應以椎管內(intracanal)或硬脊膜外(epidural)注射給藥。
- 本藥禁用於靜脈注射。
- 急、慢性感染症，使用時請同時併用適當的化學療法劑或抗生素藥品以治療感染疾病。
- 對消化管障礙如胃腸潰瘍患者務請特別注意。
- 因主要副作用為引起浮腫、血壓上升，尤以腎臟疾患及高血壓患者應注意。
- 糖尿病患者使用時，請注意增加Insulin之用量的必要。
- 對於有精神病因素者多加注意。
- 使用本藥期間請充分補充蛋白質。

【保存上之注意】

- 本藥應置於小兒伸手不及處。
- 於25°C以下儲存。
- 請在有效期限內使用。

【包裝】

- 1 mL, 2 mL, 1, 5, 10, 50 小瓶裝。
5 mL, 1, 5, 10 小瓶裝。
1 mL, 50, 100 安瓿裝。
10 mL, 20 mL, 1, 10 小瓶裝。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL IND. CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號



2143380