



永豐藥品

4-156-37-1(7)

ACIDOSIS 解毒劑
重曹注射液
BICARBONA Injection

對消化器疾患之治療，經口投與重碳酸鈉(重曹)由來已久。重曹注射液對體液之酸性化起因之Acidosis、日射病等有明顯的治療效果。

成 分 Each mL contains :

Sodium Bicarbonate 70mg
本藥倉賦形劑 Water for Injection

作 用 對身體內之新陳代謝或諸疾患起因之Acidosis如使用本劑能中和液體中之酸性物質且能恢復正常之液性。

重曹注射液與重碳酸鈉(重曹)之經口投與法相同，對膀胱、腎盂、腎臟內之粘膜、細尿管之上皮細胞，亦具有治療效果。

本劑能中和酸性之靜脈注射液。

適 應 痘 酸中毒。

用法用量 普通依症狀程度，每日或隔日注射一次20~60mL，靜脈注射。Acidosis諸症，最初注射60mL每隔2~3小時注射一次20mL至尿持續維持鹼性為止。

本藥限由醫師使用。

藥物相互作用

1. Norepinephrine, Dobutamine與Sod, Bicarbonate 液為配合禁忌。
2. 本品需避免加於含鈣之輸液，除非事先已知有相容性Sod, Bicarbonate-cal 混合物可能引起溶液之沉澱或不清，含此沉澱物之溶液不得用於注射。
3. 添加他物時，可能引起配合禁忌，可能的話應先與藥師商討，導入添加物時，可使用無菌技術混合均勻，並不得貯存。

副 作 用 1. 過度使用本品易造成酸中毒(肌肉牽攏，應激性及強直性痙攣)及血鈉過高症。



永豐藥品

4-156-37-1(7)

2. Sod, Bicarbonate 高張液靜脈注射時，如不經意外滲，因其鹼性作用，曾有引起化學性蜂窩織炎之報告。
3. 如有組織壞死，潰瘍或浸潤部位腐蝕之情事發生時，建議儘速暖和或局部注射 Lidocaine 或 Hyaluronidase，以防止因靜脈注射之外滲腐蝕。

警告事項 1. 含鈉離子之溶液，需很小心地使用於充血性心衰竭，嚴重腎不全及鈉貯留引起水腫之臨床狀態患者。
2. 腎功能減低之患者，投與含鈉離子溶液，可能引起鈉貯留。
3. 靜脈投與這些溶液會引起液體或溶質之過量負擔，導致血中電解質濃度之稀釋過分水化，充血狀態及肺水腫。

注意事項 1. Bicarbonate 帶來鈉之大量負擔，因此使用 Sod, Bicarbonate 於充血性心衰竭或水腫或其它含鈉狀態及乏尿或無尿患者需小心。
2. 投與胃腸道外液體時應小心，特別是含鈉離子及對接受 Corticosteroids 或 Corticotropin 之患者。
3. 鉀缺乏容易罹致代謝性鹼中毒，共存有血鈣過低時，當血中PH值升高，可能導致腕足痙攣，此電解質之不平衡可由優先或同時使用 Bicarbonate 輸液獲致減少。
4. 對新生兒及二歲以下快速注射 (10mL/分) 高張性 Sod, Bicarbonate 注射液時，可能導致血鈉過高症，腦脊髓液壓減少及顱內出血，因此對此患者之注射速率，宜以不超過每天每公斤體重 8meq 為限。

儲存條件 室溫保存(30°C以下)。

包 裝	塑膠安瓿	20mL/100支以下盒裝。
	玻璃安瓿	20mL/100支以下盒裝。
	小瓶	50mL, 100mL/100支以下盒裝。
	塑膠瓶 (LDPE)	50mL, 100mL, 200mL, 250mL/100支以下裝。

衛署藥製字第058007號 (原內衛藥製字第003741號換發)

◎ 永豐化學工業股份有限公司
製造廠：新莊工廠
YF CHEMICAL CORP.
新北市新莊區新樹路292號