

"生達" 速泰消膜衣錠

STAZYME F.C. TABLETS "STANDARD"

衛署藥製字 第 019353 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2022-05-06

本品為消化酵素劑，錠劑之子錠(含Lipase及Prozyme)包有腸衣，使其只有小腸內溶解，以保其有效成分不致被胃酸所破壞，在母錠(含Biodiastase及Cellulase)則包有胃溶性薄膜，使其能在胃中溶解而發揮其優良的效果。

本品含有脂肪酵素、澱粉酵素及蛋白酵素，能分解脂肪、澱粉及蛋白質，使之易為腸胃所吸收，並含有纖維分解酵素，能消化日常蔬菜類之食品，因此本品可供給主要之消化酵素，幫助不健全之消化，以分解各種日常食用之食物。

本品可緩解因消化不良而發生之症狀。

1 成分

1.1 有效成分及含量

本品每錠含有：

Biodiastase 2000.....	8000units (20mg)
Cellulase AP3.....	300units (10mg)
Lipase AP6.....	900units (15mg)
Prozyme 6.....	300units (5mg)

1.2 其他成分(賦形劑)

Lubric Wax (101)、Lactose、Cellulose Acetate Phthalate、Diethyl Phthalate、Acetone、Alcohol 95%、Silicon Dioxide、Magnesium Stearate、Potato Starch、Povidone K-30、Hydroxypropylmethylcellulose、Titanium Dioxide、Polyethylene Glycol 4000、Sunset Yellow FCF Aluminum Lake、Purified Water

2 用途(適應症)

幫助消化

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 曾因本藥成分引起過敏的人。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 3歲以下。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.1 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

3.4 其他使用上注意事項

- 3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。
- 3.4.2 避免陽光直射。
- 3.4.3 勿超過建議使用量。
- 3.4.4 藥品應整粒吞服，不得剝半或嚼碎。

4 用法用量

年齡	使用劑量	使用次數
成人及12歲以上	每次1-2錠	一天3至4次，或需要時服用，應整粒吞服，不得剝半或嚼碎
6歲以上未滿12歲	每次1錠	

5 警語

5.1 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
其他	偶有過敏

5.2 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

- 5.2.1 若有任何不適情況產生。
- 5.2.2 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

6 包裝

6-1000錠鋁箔盒、塑膠瓶裝

7 儲存方式

25°C以下儲存。

8 類別

醫師藥師藥劑生指示藥品

製造廠

生達化學製藥股份有限公司 台南市新營區土庫里土庫6之20號

藥商

生達化學製藥股份有限公司 台南市新營區土庫里土庫6之20號