

息痛佳音[®]錠 *Strocain*[®] TABLETS

(Oxethazaine製劑)

衛署藥製字第 005811 號

1 性狀

1.1 有效成分及含量

每一錠中含有 5 mg oxethazaine 及 244 mg polymigel。

1.2 賦形劑

賦形劑包括：microcrystalline cellulose, calcium stearate, talc, corn starch 及 hydrated silicon dioxide。

1.3 劑型

錠劑。

1.4 藥品外觀

本品為微帶褐色之白色裸錠。

商品名	劑型 識別碼	外形			顏色
		正面	背面	側面	
息痛佳音 [®] 錠	裸錠				白色微帶 褐色
	EISAI SR005	直徑(mm) 10.6	重量(mg) 440	厚度(mm) 4.0	

2 適應症

急性、慢性胃炎所引起的胃痛，噁心，胃灼熱以及胃部不快感。

3 用法及用量

3.1 用法用量

本藥須由醫師處方使用。

通常成人劑量為每日 3~8 錠（15-40 mg 的 oxethazaine），分 3-4 次口服使用。劑量可依患者的年齡及症狀來調整。

4 禁忌

下列患者應小心使用本品：對本品的任何成分有過敏病史的患者。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

- 給藥
本品應避免長期連續使用。
- 口服投與
錠劑應整顆服用，注意不要咬碎或是咀嚼以避免殘留口中而產生麻木感。
- 發藥時
應指導患者從 PTP 包裝之鋁箔片中取出藥品服用（有因誤食 PTP 鋁箔片，其硬銳角刺入食道黏膜，進而穿孔導致併發症，如縱隔炎的報告）。

6 特殊族群注意事項

6.1 懷孕

對於孕婦或可能懷孕的婦女，應在判斷其治療上之有益性高於危險性時才投與本品。〔本品對於孕婦之安全性尚未確立〕。

6.4 小兒

對兒童之安全性尚未確立（無充分臨床使用經驗）。

6.5 老年人

由於老年人通常具有生理性機能不足，建議於謹慎監測下酌量降低服用的劑量。

6.7 腎功能不全

腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥，可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症（Dialysis Osteomalacia）、透析性腦病變（Dialysis Encephalopathy）及低磷血症，應謹慎小心使用。

7 交互作用

目前尚無資訊。

(2) 參考文獻

- 1) Shirakabe H. et al.: Jpn. J. Clin. Exp. Med., 52, 3065, 1975.
- 2) Farrar G. E. et al.: Penn. Med. J., 65, 1369, 1962.
- 3) Seifter J. et al.: Proc. Soc. Exp. Biol. Med., 109, 664, 1962.
- 4) Posey E.L. et al.: Am. J. Gastroenterol., 55, 54, 1971.
- 5) Posey E.L. et al.: Am. J. Dig. Dis., 14, 797, 1969.
- 6) Yamagata S. et al.: SHINRYO, 21, 1035, 1969.
- 7) Namba R. et al.: Jpn. J. Gastroenterol., 63, 271, 1966.

(3) 修訂版本日期：2021 年 12 月 6 日

製造廠：保瑞藥業股份有限公司
台南市官田區工業西路 54 號



藥商：衛采製藥股份有限公司
台北市中山區長安東路一段 18 號 9 樓